

レジメン名 : mFOLF0X6+Zolbetuximab (2コース目以降) (1コース2週間) レジメンコード : 346-2-1

レジメン期間 : 14日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 胃がん

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 001 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ハロペト静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン) ポララミン注 5mg/1mL アロカリス点滴静注235mg | 1 V 1 V 3 A 1 A 1 V | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分 | ● | | | |
| 002 注射 | 溶解液(自動計算) 輸液(自動計算) ◆ビロイ注 インラインフィルター使用。 | 自動 自動 400 mg/m ² | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) | ● | | | |
| 003 注射 | 5%ブドウ糖注 250mL ◆エルブラット注射用 ルボホリナートと同時 | 1 袋 85 mg/m ² | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分 | ● | | | |
| 004 注射 | 5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注用 エルブラットと同時 | 1 袋 200 mg/m ² | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分 | ● | | | |
| 005 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) ◆5-FU注 全開 | 1 V 400 mg/m ² | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) | ● | | | |
| 006 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) | ● | | | |
| 007 注射 | 輸液(自動計算) ◆5-FU注(インフューザ-ホップ) 46時間持続。クソム確認。 | 自動 2400 mg/ m ² | 腫瘍剤静脈内局所持続 注入(精密・速度指示 46時間) | ● | | | |
| 008 前投 | ★[4] デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用 | 2 錠 | 分2 : 朝食後約30 分 | | ● | ● | ● |
| 【レジメンコメント】 インフューザ-ホップのクソムを確認! ビロイ注の投与速度は指示コメントを参照。指示コメントがない場合は主治医へ 確認。 | | | | | | | |