

レジメン名 : TIP (PTX+IFM+CDDP) (1コース3週間) レジメンコード : 303-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 泌尿器科

がん種 : 精巣腫瘍

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
001 注射	ソルデム3A 500mL	1袋	点滴注射 8時間	●						
002 注射	ソルデム3A 500mL	1袋	点滴注射 8時間	●						
003 注射	ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1袋 1A	点滴注射 8時間	●						
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトド静注0.75mg/5mL「タイド」(アキシ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトド) ガスター注 20mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1V 1V 5A 1A 1A	点滴注射 30分	●						
005 注射	生理食塩液注 500mL ◆パクリタキセル注	1V 175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 180分	●						
006 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1V	点滴注射	●						
007 注射	ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1袋 1A	点滴注射 6時間		●	●	●	●	●	
008 注射	ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1袋 1A	点滴注射 6時間		●	●	●	●	●	
009 注射	ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1袋 1A	点滴注射 6時間		●	●	●	●	●	
010 注射	ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1袋 1A	点滴注射 6時間		●	●	●	●	●	
011 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトド)	1V 3A	点滴注射 30分		●	●	●	●	●	
012 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	1V 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 120分		●	●	●	●	●	
013 注射	生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL イマド 投与前	1V 400 mg	点滴注射 30分		●	●	●	●	●	
014 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆注射用イホマイド	1V 1.2 g/m <sup>2</sup>	点滴注射 120分		●	●	●	●	●	
015 注射	生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL イマド 投与時から4時間後	1V 400 mg	点滴注射 30分		●	●	●	●	●	
016 注射	生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL イマド 投与時から8時間後	1V 400 mg	点滴注射 30分		●	●	●	●	●	
017 前投	[125]アベラントカセル125mg「サリ」(イマド) 妊開始時【外来は処置として使用】	1C	分1 : 医師の指示通り		●					
018 前投	[80]アベラントカセル80mg「サリ」(イマド) 午前中 2日目から服用	1C	分1 : 朝食後約30分			●	●	●	●	
019 注射	ジーラスタ皮下注 3.6mg イマド 投与後24時間以上あける	1筒	皮下注射							●