

レジメン名 : BEP療法 (CDDP+VP-16) (3~4コース) (1コース3週間) 精巣癌 レジメンコード : 94-1-2

レジメン期間 : 21日 診療科 : 泌尿器科

がん種 : 精巣腫瘍

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
001 注射	ソルデム1 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●	●	●	●	●
002 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●	●	●	●	●
003 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●	●	●	●	●
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 A 2 A	点滴注射 30分	●	●	●	●	●
005 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●	●	●	●	●
006 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分	●	●	●	●	●
007 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトポシド点滴静注液	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 2時間	●	●	●	●	●
008 前投	[125]ア <sup>99m</sup> Tc <sup>99m</sup> チタニウム <sup>99m</sup> Tc <sup>99m</sup> セル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●				
009 前投	[80]ア <sup>99m</sup> Tc <sup>99m</sup> チタニウム <sup>99m</sup> Tc <sup>99m</sup> セル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	●	●
【レジメンコメント】 2~4コース実施 プレオ : 3コース目からは省く								