

レジメン名 : mFOLFIRINOX レジメンコード : 210-1-2

レジメン期間 : 14日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 膵臓がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセト静注0.75mg/5mL「タイク」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカト)	1 V 1 V 3 A	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分	●			
002 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆エルブラット注射用	1 袋 85 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注 レボホリナートと同時	1 V 150 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注用 カンプトと同時	1 袋 200 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●			
006 注射	輸液(自動計算) ◆5-FU注(インフューザ-ポンプ) 46時間持続。クレン確認。	自動 2400 mg/m ²	腫瘍剤静脈内局所持続 注入(精密・速度指示 46時間)	●			
007 前投	[125]アブビタカセル125mg「サワイ」(イメント) 抗がん剤投与1時間前に服用【外来は処置として 使用】	1 C	分1	●			
008 前投	[80]アブビタカセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
009 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝昼食後約30 分		●	●	●
【レジメンコメント】 インフューザ-ポンプのクレンを確認!							