

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--------------------------------|-----------------------|
| 院外専用 | アーチスト錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | アイクルシグ錠15mg | 15mg/T |
| 院外専用 | アイファガン点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | アイベータ配合点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アイミクス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | アイミクス配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アウイクリ注フレックスタッチ総量700単位 | 700単位/キット |
| 院外専用 | 亜鉛華（10%）単軟膏シオエ | 10%500g/本 |
| 院外専用 | アクアチムローション1% | 1%20mL/本 |
| 院外専用 | アジマイシン点眼液1% | 1%2.5mL/本 |
| 院外専用 | アジルバ錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | アジルバ錠40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | アジレクト錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院外専用 | アスタット軟膏1% | 1%10g/本 |
| 院外専用 | アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 | 200 μ g/吸入、60吸入/本 |
| 院外専用 | アゼブチン錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」 | 20mg0.4mL/筒 |
| 院外専用 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 | 40mg0.8mL/キット |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | 1cap |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | 1cap |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 | 1cap |
| 院外専用 | アテディオ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | アテレック錠20 | 20mg/T |
| 院外専用 | アドエア250ディスカス60吸入用 | 60プリスター/キット |
| 院外専用 | アドエア500ディスカス60吸入用 | 60プリスター/キット |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | アトラントクリーム1% | 1%10g/本 |
| 院外専用 | アナフラニール錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | アナフラニール錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 | 100 μ g/吸入、30吸入/本 |
| 院外専用 | アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 | 200 μ g/吸入、30吸入/本 |
| 院外専用 | アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | 25 μ g/T |
| 院外専用 | アボカイン皮下注30mg | 30mg3mL/筒 |
| 院外専用 | アボハイドローション20% | 20%4.5mL/本 |
| 院外専用 | アミサリン錠125mg | 125mg/T |
| 院外専用 | アモキシサンカプセル25mg | 25mg/cap |
| 院外専用 | アモバン錠7.5 | 7.5mg/T |
| 院外専用 | アリセプトD錠3mg | 3mg/T |
| 院外専用 | アリセプトD錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | アリドネパッチ27.5mg | 27.5mg/枚 |
| 院外専用 | アルケラン錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | アルダクトンA細粒10% | 100mg/g |
| 院外専用 | アルメタ軟膏 | 0.1%5g/本 |
| 院外専用 | アレグラ錠60mg | 60mg/T |
| 院外専用 | アレサガテープ4mg | 4mg/枚 |
| 院外専用 | アレサガテープ8mg | 8mg/枚 |
| 院外専用 | アレジオンLX点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | アレジオン点眼液0.05% | 0.05%5mL/本 |
| 院外専用 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 0.5%/g |
| 院外専用 | アレロックOD錠2.5 | 2.5mg/T |
| 院外専用 | アレロックOD錠5 | 5mg/T |
| 院外専用 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 10mg/T |
| 院外専用 | アロマシン錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | アンカロン錠100 | 100mg/T |
| 院外専用 | アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 15mg/T |
| 院外専用 | イーケブラ錠250mg | 250mg/T |
| 院外専用 | イグザレルトOD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | イグザレルトOD錠15mg | 15mg/T |
| 院外専用 | イクセロンパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 |
| 院外専用 | イクセロンパッチ9mg | 9mg/枚 |
| 院外専用 | イクセロンパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 |
| 院外専用 | イクセロンパッチ18mg | 18mg/枚 |
| 院外専用 | イスコチン原末 | 末 |
| 院外専用 | イソジンガーグル液7% | 7%30mL/本 |
| 院外専用 | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 70%30g/個 |
| 院外専用 | イトリゾールカプセル50 | 50mg/cap |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | 37.5mg/cap |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル75mg | 75mg/cap |
| 院外専用 | イムブルピカカプセル140mg | 140mg/cap |
| 院外専用 | イメンドカプセル80mg | 80mg/cap |
| 院外専用 | イメンドカプセル125mg | 125mg/cap |
| 院外専用 | イリボー錠2.5 μ g | 2.5 μ g/T |
| 院外専用 | イリボー錠5 μ g | 5 μ g/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 院外専用 | イルトラ配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | イルトラ配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | イルベタン錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | インスリングルギンBS注カート「リリー」 | 300単位/カート |
| 院外専用 | インデバンクリーム1% | 1%25g/本 |
| 院外専用 | ウインタミン細粒（10%） | 100mg/g |
| 院外専用 | ウェリレグ錠40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | ヴォリプリス錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | ウゴービ皮下注0.25mg SD | 0.25mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ウゴービ皮下注0.5mg SD | 0.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ウゴービ皮下注1.0mg SD | 1mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ウゴービ皮下注1.7mg SD | 1.7mg0.75mL/キット |
| 院外専用 | ウゴービ皮下注2.4mg SD | 2.4mg0.75mL/キット |
| 院外専用 | ウリアデック錠40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | ウルソ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | エイベリス点眼液0.002% | 0.002%2.5mL/本 |
| 院外専用 | AZ点眼液0.02% | 0.02%5mL/本 |
| 院外専用 | エカード配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | エキザルベ | 5g/本 |
| 院外専用 | エクア錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | エクメット配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | エクメット配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 | 60吸入/キット |
| 院外専用 | エクロックゲル5% | 20g/本 |
| 院外専用 | SG配合顆粒 | 1g/包 |
| 院外専用 | エストラサイトカプセル156.7mg | 156.7mg/Cap |
| 院外専用 | エストリール錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | エックスフォージ配合OD錠 | 1錠 |
| 院外専用 | エナロイ錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | エネーゴ配合経腸用液 | 250mL/缶 |
| 院外専用 | エバステルOD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | エビスタ錠60mg | 60mg/T |
| 院外専用 | エビデュオゲル | 15g/本 |
| 院外専用 | エビリファイ内用液0.1% | 1mg/mL |
| 院外専用 | エビレオプチマル散50% | 500mg/g |
| 院外専用 | エフィエント錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | エフィエント錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | MSコンチン錠30mg | 30mg/T |
| 院外専用 | エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 200 μ g28噴霧用5.6mg/本 |
| 院外専用 | エリスロシン錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 | 1g/包 |
| 院外専用 | エンクラッセ62.5 μ gエリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | エンシュア・H | 250mL/缶 |
| 院外専用 | エンシュア・リキッド | 250mL/本 |
| 院外専用 | エンドキサン錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 | 252 μ g/本（1回吸入量：9 μ g） |
| 院外専用 | オキサロールローション25 μ g/g | 0.0025%10g/本 |
| 院外専用 | オスボロット錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | オゼックス細粒小児用15% | 150mg（トスフロキサシンとして102mg）/g |
| 院外専用 | オダイン錠125mg | 125mg/T |
| 院外専用 | オテズラ錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | オテズラ錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | オテズラ錠30mg | 30mg/T |
| 院外専用 | オバルモン錠5 μ g | 5 μ g/T |
| 院外専用 | オメブラール錠20 | 20mg/T |
| 院外専用 | オラビ錠口腔用50mg | 50mg/個 |
| 院外専用 | オルメテックOD錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | カイトリル細粒0.4% | 2mg/0.5g/包（グラニセトロンとして） |
| 院外専用 | ガストローム顆粒66.7% | 66.7%1.5g/包 |
| 院外専用 | ガスロンN錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | カンデックスOD錠80mg | 80mg/T |
| 院外専用 | カデュエット配合錠4番 | 1錠 |
| 院外専用 | カナグル錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | カナリア配合OD錠 | 1錠 |
| 院外専用 | カラムンローション | 500mL/本 |
| 院外専用 | カルブロック錠16mg | 16mg/T |
| 院外専用 | カログラ錠120mg | 120mg/T |
| 院外専用 | 乾燥酵母エビオス | 500g/缶 |
| 院外専用 | キサラタン点眼液0.005% | 0.005%2.5mL/本 |
| 院外専用 | キャブピリン配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | キュパール100エアゾール | 8.7g/本（1回の噴霧主薬量：100 μ g） |
| 院外専用 | グラアルファ配合点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | グラクティブ錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | クラシエ薬胡桂湯エキス細粒〔EK-10〕 | 2.0g/包 |
| 院外専用 | グラナテック点眼液0.4% | 0.4%5mL/本 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 院外専用 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 10.1g/瓶 |
| 院外専用 | クラビット錠500mg | 500mg/T |
| 院外専用 | クラビット点眼液0.5% | 0.5%5mL/本 |
| 院外専用 | クラビット点眼液1.5% | 1.5%5mL/本 |
| 院外専用 | クラリス錠50小児用 | 50mg/T |
| 院外専用 | クラリチン錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | グリベック錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」 | 1%10g/本 |
| 院外専用 | クービビック錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | クービビック錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | グルファスト錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | グルベス配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | クレストールOD錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | クレストールOD錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | クレナフィン爪外用液10% | 10%3.56g (4mL) 1本 |
| 院外専用 | グロウジェクト皮下注12mg | 12mg1.5mL/筒 |
| 院外専用 | クロミッド錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ケフラルカプセル250mg | 250mg/cap |
| 院外専用 | ケレンディア錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | ケレンディア錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | コソプトミニ配合点眼液 | 0.4mL/個 |
| 院外専用 | コニール錠4 | 4mg/T |
| 院外専用 | コムクロシャンプー-0.05% | 0.05%125mL/本 |
| 院外専用 | コラン錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.25% | 0.25%5g/本 |
| 院外専用 | コレチメント錠9mg | 9mg/T |
| 院外専用 | コンサータ錠18mg | 18mg/T |
| 院外専用 | コンサータ錠27mg | 27mg/T |
| 院外専用 | コントミン糖衣錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ザイザル錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | ザイティガ錠500mg | 500mg/T |
| 院外専用 | サイトテック錠200 | 200 μ g/T |
| 院外専用 | サイバインコ錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | サイバインコ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | サイバインコ錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | ザガーロカプセル0.1mg | 0.1mg/cap |
| 院外専用 | ザクラス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | ザファテック錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | サラジェン錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | サワシリンカプセル250 | 250mg/cap |
| 院外専用 | シアリス錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | シアリス錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | シープリ吸入用カプセル50 μ g | 50 μ g/cap |
| 院外専用 | ジュニナック錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ジクアスLX点眼液3% | 5mL/本 |
| 院外専用 | ジスロマック細粒小児用10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ジセレカ錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | ジフルカンカプセル50mg | 50mg/cap |
| 院外専用 | ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%10g/本 |
| 院外専用 | ジャカビ錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | シングレアOD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | シンフェーズT28錠 | (28日分) 1組 (淡青色錠12錠, 白色錠9錠, だいたい色錠7錠) |
| 院外専用 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター | 50mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | スージャヌ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | スチバール錠40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | ストラテラカプセル40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | ストロカイン錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | スピール膏M | 0.8925g/枚 (25cm2/枚) |
| 院外専用 | スピリーバ1.25 μ gレスピマット60吸入 | 1.25 μ g60吸入/本 |
| 院外専用 | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g | 18 μ g/cap |
| 院外専用 | スプリセル錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | スプリセル錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | スマイラフ錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | スマイラフ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | ゼジューラ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | ゼチーア錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 10mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス | 15mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | セディール錠10mg | 10mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|------------------------------|-------------------|
| 院外専用 | セバノン錠2 | 2mg/T |
| 院外専用 | ゼビアックスローション2% | 20mg/g |
| 院外専用 | セファランチン錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | ゼフィックス錠100 | 100mg/T |
| 院外専用 | ゼフナートクリーム2% | 2%10g/本 |
| 院外専用 | ゼフナート外用液2% | 2%10mL/本 |
| 院外専用 | ゼベリン点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | セレコックス錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | セレネース細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | セレネース錠3mg | 3mg/T |
| 院外専用 | ゼローダ錠300 | 300mg/T |
| 院外専用 | セロクエル細粒50% | 500mg/g |
| 院外専用 | ソーティクツ錠6mg | 6mg/T |
| 院外専用 | ゾピラックス錠200 | 200mg/T |
| 院外専用 | ソリターT配合顆粒2号 | 4g/包 |
| 院外専用 | ソレトン錠80 | 80mg/T |
| 院外専用 | ダイアート錠60mg | 60mg/T |
| 院外専用 | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒〔TM-230〕 | 2g/包 |
| 院外専用 | タウリン散98%〔大正〕 | 98%（1包1.02g） |
| 院外専用 | 高砂テンマ末M | 末 |
| 院外専用 | ダクチル錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | タケブロンOD錠15 | 15mg/T |
| 院外専用 | タケルダ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | タナトリル錠5 | 5mg/T |
| 院外専用 | タバリス錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | タバリス錠150mg | 150mg/T |
| 院外専用 | タブコム配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | タブロス点眼液0.0015% | 0.0015%2.5mL/本 |
| 院外専用 | タブロスミニ点眼液0.0015% | 0.0015%0.3mL/本 |
| 院外専用 | タベジール錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | タリオンOD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | チモプトール点眼液0.5% | 0.5%5mL/本 |
| 院外専用 | チモプトールXE点眼液0.5% | 0.5%2.5mL/本 |
| 院外専用 | チャンピックス錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院外専用 | チャンピックス錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | チラーヂンS錠25μg | 25μg/T |
| 院外専用 | ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-106〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-72〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-18〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ-70〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-12〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-103〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-93〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-71〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）〔TJ-22〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-104〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）〔TJ-66〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-136〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-53〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-97〕 | 3.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）〔TJ-86〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-34〕 | 3g/包 |
| 院外専用 | ツムラよく攻仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-52〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-87〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ティーエスワン配合OD錠T20 | 20mg/T（テガファール相当量） |
| 院外専用 | ティーエスワン配合OD錠T25 | 25mg/T（テガファール相当量） |
| 院外専用 | ティーエスワン配合顆粒T20 | 0.2g/包 |
| 院外専用 | ティーエスワン配合顆粒T25 | 0.25g/包 |
| 院外専用 | ディナゲスト錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院外専用 | ディレグラ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | デザレックス錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | テネリアOD錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | デノゼット錠300mg | 300mg/T |
| 院外専用 | デバケンR錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | デュオトラバ配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.1mg/枚 |
| 院外専用 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.2mg/枚 |
| 院外専用 | デュロテップMTパッチ8.4mg | 8.4mg/枚 |
| 院外専用 | トフラニール錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | トフラニール錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ドボネックス軟膏50μg/g | 0.005%10g/本 |
| 院外専用 | ドボベット軟膏 | 15g/本，30g/本 |
| 院外専用 | ドボベットゲル | 15g/本 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-------------------------------|----------------------------|
| 院外専用 | ドボベツフォーム | 60g/本 |
| 院外専用 | ドラール錠15 | 15mg/T |
| 院外専用 | トラディアンス配合錠AP | 1錠 |
| 院外専用 | トラバタンズ点眼液0.004% | 0.004%2.5mL/本 |
| 院外専用 | トラムセツ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | トリテレン・カプセル50mg | 50mg/cap |
| 院外専用 | トリプタノール錠25 | 25mg/T |
| 院外専用 | トリンテリックス錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | トルカブ錠160mg | 160mg/T |
| 院外専用 | トルカブ錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | トルソプト点眼液1% | 1%5mL/本 |
| 院外専用 | トレシーバ注ベンフィル | 300単位3mL/筒 |
| 院外専用 | トレドミン錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | トレリーフOD錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ナバゲルンローション3% | 3%50mL/本 |
| 院外専用 | ナルサス錠12mg | 12mg/T |
| 院外専用 | ナルサス錠24mg | 24mg/T |
| 院外専用 | ナルラビド錠4mg | 4mg/T |
| 院外専用 | ニコチネルTTS10 | 17.5mg/枚 |
| 院外専用 | ニコチネルTTS20 | 35mg/枚 |
| 院外専用 | ニコチネルTTS30 | 52.5mg/枚 |
| 院外専用 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | 10%500g/本 |
| 院外専用 | ニゾラルローション2% | 2%10g/本 |
| 院外専用 | ニフラン点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | ニュープロバッチ4.5mg | 4.5mg/枚 |
| 院外専用 | ニュープロバッチ18mg | 18mg/枚 |
| 院外専用 | ニューベクオ錠300mg | 300mg/T |
| 院外専用 | ネイリンカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院外専用 | ネオーラル10mgカプセル | 10mg/cap |
| 院外専用 | ネオキシターブ73.5mg | 73.5mg |
| 院外専用 | ネオメドロールEE軟膏 | 3g/本 |
| 院外専用 | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | ノックピン原末 | 末 |
| 院外専用 | ノベルジン錠25mg | 25mg/T（亜鉛として） |
| 院外専用 | ノベルジン錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン | 300単位3mL/筒 |
| 院外専用 | ノリトレン錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ノルスバンテープ5mg | 5mg/枚 |
| 院外専用 | ノルスバンテープ10mg | 10mg/枚 |
| 院外専用 | ノルデイトロビンフレックスプロ注10mg | 10mg1.5mL/キット |
| 院外専用 | パーロデル錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | バイアグラ錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | バイアグラ錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ハイバジールコーワ点眼液0.25% | 0.25%5mL/本 |
| 院外専用 | パナルジン錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | パナン錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | パフセオ錠150mg | 150mg/T |
| 院外専用 | パラミジンカプセル300mg | 300mg/cap |
| 院外専用 | バリエット錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | バリエット錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | バルトレックス錠500 | 500mg/T |
| 院外専用 | バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 | 11.2mg/本（1吸入量：200 μ g） |
| 院外専用 | バルミコート吸入液0.25mg | 0.25mg2mL/A |
| 院外専用 | バルミコート吸入液0.5mg | 0.5mg2mL/A |
| 院外専用 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 0.3%0.4mL/本 |
| 院外専用 | ピオチン散0.2%「フソー」 | 2mg/g |
| 院外専用 | ヒスロン錠5 | 5mg/T |
| 院外専用 | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | 100mg/g |
| 院外専用 | ビブレッツ徐放錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ビブレッツ徐放錠150mg | 150mg/T |
| 院外専用 | ビベスピアロスフィア120吸入 | 120吸入/キット |
| 院外専用 | ビムバットドライシロップ10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ヒューマログ注ミリオベンHD | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 40mg0.4mL/筒 |
| 院外専用 | ビルタサ懸濁用散分包8.4g | 8.4g/包 |
| 院外専用 | ヒルドイドクリーム0.3% | 0.3%20g/本 |
| 院外専用 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 0.3%25g/本、0.3%100g/本 |
| 院外専用 | ヒルドイドフォーム0.3% | 0.3%92g/本 |
| 院外専用 | ヒルドイドローション0.3% | 0.3%50g/本 |
| 院外専用 | ヒルナミン細粒10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ビレチア細粒10% | 100mg/g |
| 院外専用 | 5-FU軟膏5%協和 | 5g/本 |
| 院外専用 | ファムビル錠250mg | 250mg/T |
| 院外専用 | ファロムドライシロップ小児用10% | 100mg/g |
| 院外専用 | フィコンバ錠4mg | 4mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ブイフェンド錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ブイフェンド錠200mg | 200mg/T |
| 院外専用 | フェアストン錠40 | 40mg/T |
| 院外専用 | フオイバン錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | フォシーガ錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | フォルテオ皮下注キット600μg | 600μg/キット |
| 院外専用 | ブコラム口腔用液2.5mg | 2.5mg0.5mL/筒 |
| 院外専用 | ブコラム口腔用液5mg | 5mg1mL1/筒 |
| 院外専用 | ブコラム口腔用液7.5mg | 7.5mg1.5mL/筒 |
| 院外専用 | ブシ末（調剤用）「ツムラ」（TJ-3023） | 末 |
| 院外専用 | ブラノバル配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ブラビックス錠75mg | 75mg/T |
| 院外専用 | ブリカニール錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | フリバスOD錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | フリバスOD錠75mg | 75mg/T |
| 院外専用 | フリュザクラカプセル1mg | 1mg/cap |
| 院外専用 | フリュザクラカプセル5mg | 5mg/cap |
| 院外専用 | プリンベラン錠5 | 5mg/T |
| 院外専用 | フルタイド200ディスカス | 200μg・60プリスター/個 |
| 院外専用 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 9.72mg10.6g/缶（1吸入量：50μg） |
| 院外専用 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 120吸入/瓶 |
| 院外専用 | ブルフェン錠100 | 100mg/T |
| 院外専用 | フルメジン散0.2% | 2mg/g |
| 院外専用 | フルメジン糖衣錠（0.5） | 0.5mg/T |
| 院外専用 | ブレドニン錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | ブレミネント配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | プロ・パンサイン錠15mg | 15mg/T |
| 院外専用 | フロジン外用液5% | 5%30mL/本 |
| 院外専用 | プロスター錠25 | 25mg/T |
| 院外専用 | プロセキソール錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院外専用 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 40mg/g |
| 院外専用 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | 0.03%5g/本 |
| 院外専用 | プロトピック軟膏0.1% | 0.1%5g/本 |
| 院外専用 | プロナック点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | プロベシア錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | ベイスンOD錠0.3 | 0.3mg/T |
| 院外専用 | ベストロン点眼用0.5% | 0.5%5mL/本 |
| 院外専用 | ベセルナクリーム5% | 12.5mg250mg/包 |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 0.3%100g/本 |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 0.3%100g/本 |
| 院外専用 | ベピオローション2.5% | 2.5%15g/本 |
| 院外専用 | ベピオゲル2.5% | 15g/本 |
| 院外専用 | ベリキューゴ錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | ベリキューゴ錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | ベルサンチン錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ベルサンチン錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | ベンタサ錠250mg | 250mg/T |
| 院外専用 | ベンタサ注腸1g | 1g100mL/個 |
| 院外専用 | ベンタサ顆粒94% | 2000mg/包 |
| 院外専用 | ボシュリフ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | ホスミシンS耳科用3% | 3%10mL/本（溶解後） |
| 院外専用 | ホスレノールOD錠250mg | 250mg/T |
| 院外専用 | ボナロン錠35mg | 35mg/T |
| 院外専用 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg/cap |
| 院外専用 | ボルタレンサゴ12.5mg | 12.5mg/個 |
| 院外専用 | ボルタレンサゴ25mg | 25mg/個 |
| 院外専用 | ボルタレンサゴ50mg | 50mg/個 |
| 院外専用 | ボンアルファハイローション20μg/g | 0.002%10g/本 |
| 院外専用 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g | 0.002%10g/本 |
| 院外専用 | ボンタールシロップ3.25% | 3.25%32.5mg/mL |
| 院外専用 | ボンビバ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | マーズレンS配合顆粒 | バラ包装のみ |
| 院外専用 | マーデュオックス軟膏 | 10g/本 |
| 院外専用 | マイザークリーム0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院外専用 | マイスタン錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | マイスリー錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | マクサルトRPD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | マスーレッド錠12.5mg | 12.5mg/T |
| 院外専用 | マスーレッド錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | マルファ懸濁用配合顆粒 | 1.2g/包 |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注10mgアテオス | 10mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注15mgアテオス | 15mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ミカトリオ配合錠 | 1錠 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ミカムロ配合錠AP | 1錠 |
| 院外専用 | ミカムロ配合錠BP | 1錠 |
| 院外専用 | ミカルデイス錠40mg | 40mg/T |
| 院外専用 | ミケランLA点眼液2% | 2%2.5mL/本 |
| 院外専用 | ミケラン点眼液2% | 2%5mL/本 |
| 院外専用 | ミケルナ配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | ミニリンメルトOD錠25 μ g | 25 μ g/T |
| 院外専用 | ムコスタ点眼液UD2% | 2%0.35mL/本 |
| 院外専用 | ムコダイン錠500mg | 500mg/T |
| 院外専用 | ムコダインDS50% | 50% 500mg/g |
| 院外専用 | メサデルムローション0.1% | 0.1%10g/本 |
| 院外専用 | メジコン錠15mg | 15mg/T |
| 院外専用 | メタライト250カプセル | 250mg/cap |
| 院外専用 | メトリジンD錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | メドロール錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ソルハラ」 | 7.5mg/T |
| 院外専用 | メマリードライシロップ2% | 5mg0.25g/包 |
| 院外専用 | メマリードライシロップ2% | 10mg0.5g/包 |
| 院外専用 | メマリードライシロップ2% | 20mg1g/包 |
| 院外専用 | メマリーOD錠5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | メマリーOD錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | メマリーOD錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2mg/g |
| 院外専用 | メリスロン錠6mg | 6mg/T |
| 院外専用 | メルカゾール錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏0.3% | 0.3%10g/本 |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏1% | 1%10g/本 |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏1% | 1%28g/本 |
| 院外専用 | モーバー錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | モーラステープL40mg | 7枚/袋 |
| 院外専用 | モーラスバップXR120mg | 10cm×14cm/枚 |
| 院外専用 | ヤーズ配合錠 | 28錠/シート |
| 院外専用 | ヤーズフレックス配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ユーエフティ配合カプセルT100 | 100mg/cap（テガファール相当量） |
| 院外専用 | ユーエフティE配合顆粒T150 | 150mg0.75g/包（テガファール相当量） |
| 院外専用 | ユーゼル錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ユーバスタ軟膏 | 30g/本、100g/本 |
| 院外専用 | ユベラ軟膏 | 56g/本 |
| 院外専用 | ユベラNカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院外専用 | ユリーフOD錠4mg | 4mg/T |
| 院外専用 | ユリス錠0.5mg | 0.5mg |
| 院外専用 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 1錠 |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用液 | 200mL/パウチ |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用液 | 400mL/バッグ |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g/バッグ |
| 院外専用 | ラツーダ錠20mg | 20mg/T |
| 院外専用 | ラニラビッド錠0.05mg | 0.05mg/T |
| 院外専用 | ラミクタール錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | ラミクタール錠小児用2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | ラミクタール錠小児用5mg | 5mg/T |
| 院外専用 | ランタス注シロスター | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | リオベル配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | リザベンカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院外専用 | リザベン点眼液0.5% | 0.5%5mL/本 |
| 院外専用 | リスバダール細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | リスバダール錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | リスモダンカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院外専用 | リットフーロカプセル50mg | 50mg/cap |
| 院外専用 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 0.3%5g/本 |
| 院外専用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL/本（レボカバスチンとして） |
| 院外専用 | リボバス錠5 | 5mg/T |
| 院外専用 | リムバーザ錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | リムバーザ錠150mg | 150mg/T |
| 院外専用 | リンデロン錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院外専用 | ルコナック爪外用液5% | 5%4mL/本 |
| 院外専用 | ルジオミール錠10mg | 10mg/T |
| 院外専用 | ルセフィ錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院外専用 | ルナベル配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | ルブラック錠8mg | 8mg/T |
| 院外専用 | ルムジェブ注ミリオベンHD | 300単位/キット |
| 院外専用 | レイボー錠100mg | 100mg/T |
| 院外専用 | レキサルティOD錠1mg | 1mg/T |
| 院外専用 | レキサルティOD錠2mg | 2mg/T |
| 院外専用 | レキソタン錠2 | 2mg/T |
| 院外専用 | レキップCR錠2mg | 2mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 院外専用 | レキップCR錠8mg | 8mg/T |
| 院外専用 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 14回分/本 |
| 院外専用 | レクチゾール錠25mg | 25mg/T |
| 院外専用 | レグテクト錠333mg | 333mg/T |
| 院外専用 | レザルタス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | レザルタス配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | レスキュラ点眼液0.12% | 0.12%5mL/本 |
| 院外専用 | レスリン錠25 | 25mg/T |
| 院外専用 | レバーサ皮下注140mgペン | 140mg1mL/キット |
| 院外専用 | リバゼブ配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | リバルエンLAパッチ25.92mg | 25.92mg/枚 |
| 院外専用 | リバルエンLAパッチ51.84mg | 51.84mg/枚 |
| 院外専用 | リフスア錠45mg | 45mg/T |
| 院外専用 | レボカバステン点眼液0.025%「TS」 | 0.025%5mL/本 |
| 院外専用 | レミニールOD錠12mg | 12mg/T |
| 院外専用 | レンドルミンD錠0.25mg | 0.25mg/T |
| 院外専用 | ロキシニンテープ50mg | 50mg1g/枚（7cm×10cm/枚）（1袋：7枚入り） |
| 院外専用 | ロキシニンテープ100mg | 100mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚入り） |
| 院外専用 | ロコアテープ | 10cm×14cm1枚 |
| 院外専用 | ロスーゼット配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | ロスーゼット配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | ロゼックスゲル0.75% | 0.75mg/g |
| 院外専用 | ロドビン細粒10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ロドビン錠50mg | 50mg/T |
| 院外専用 | ロトリガ粒状カプセル2g | 2g/cap |
| 院外専用 | ロングス錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | アーテン錠（2mg） | 2mg/T |
| 院内 | アービタックス注射液100mg | 100mg20mL/V |
| 院内 | アービタックス注射液500mg | 500mg100mL/V |
| 院内 | アーリーダ錠60mg | 60mg/T |
| 院内 | アイオピジンUD点眼液1% | 1%0.1mL/本 |
| 院内 | アイビーディカプセル100 | 100mg/cap |
| 院内 | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | 2mg0.05mL/キット |
| 院内 | アウイクリ注フレックススタッチ総量300単位 | 300単位/キット |
| 院内 | 亜鉛華軟膏＜ハチ＞ | 18.5～21.5%500g/本 |
| 院内 | アキネトン錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | アキネトン注射液5mg | 5mg1mL/A |
| 院内 | アクアチムクリーム1% | 1%10g/本 |
| 院内 | アクチバシン注2400万 | 2,400万I.U./V（溶解液付） |
| 院内 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg4mL/V |
| 院内 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg10mL/V |
| 院内 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0.9mL/キット |
| 院内 | アクトス錠15 | 15mg/T |
| 院内 | アクトネル錠17.5mg | 17.5mg/T |
| 院内 | アクトヒブ | 10μg/V |
| 院内 | アコファイド錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | アサコール錠400mg | 400mg/T |
| 院内 | アザルフィジンEN錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 | 250mg/V |
| 院内 | アジャストAコーワ錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | アジョビ皮下注225mgシリンジ | 225mg/本 |
| 院内 | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 20mg/T |
| 院内 | アスコルビン酸「ケンエー」 | 未 |
| 院内 | アズノールうがい液4% | 4%5mL/本 |
| 院内 | アズノール軟膏0.033% | 0.033%20g/本 |
| 院内 | アズノール軟膏0.033% | 0.033%500g/個 |
| 院内 | アスパラカリウム錠300mg | 300mg（K【上つ】＋【復】：1.8mEq）/T |
| 院内 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | 1712mg10mL/キット（K【上つ】＋【復】：10mEq/10mL） |
| 院内 | アスパラーCA錠200 | 200mg/T |
| 院内 | アスベノンカプセル20 | 20mg/cap |
| 院内 | アスベリンシロップ0.5% | 5mg/mL |
| 院内 | アスベリン散10% | 100mg/g |
| 院内 | アセサイド6%消毒液 | 6%875mL/本（第一剤），緩衝剤875mL/本（第二剤） |
| 院内 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%20mL/本 |
| 院内 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「NIG」 | 100mg/個 |
| 院内 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」 | 200mg/個 |
| 院内 | アセリオ静注液1000mgバッグ | 1,000mg100mL/袋 |
| 院内 | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 16mg/T |
| 院内 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 60mg/T |
| 院内 | アタラックス－Pカプセル25mg | ヒドロキシジン塩酸塩として25mg/cap |
| 院内 | アタラックス－P注射液（25mg/ml） | 25mg1mL/A |
| 院内 | アデホスコ－ワ顆粒10% | 10%1g/包 |
| 院内 | アテレック錠10 | 10mg/T |
| 院内 | アドエア50エアゾール120吸入用 | 120回噴霧/缶 |
| 院内 | アドエア100ディスカス60吸入用 | 60プリスター/キット |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------------|--------------------------------|
| 院内 | アドエア250エアゾール120吸入用 | 120回噴霧/缶 |
| 院内 | アトニン－O注5単位 | 5単位1mL/A |
| 院内 | アドフィードバップ40mg | 40mg12g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚入） |
| 院内 | アドリアシン注用10 | 10mg/V |
| 院内 | アドリアシン注用50 | 50mg/V |
| 院内 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 10mg/T |
| 院内 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1mg1mL/本 |
| 院内 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.5mg1mL/筒 |
| 院内 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1mL/A |
| 院内 | アトロベントエロソール20 μ g | 4.2mg10mL/本 |
| 院内 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 1mg/T |
| 院内 | アナベイン注2mg/mL | 200mg100mL/袋 |
| 院内 | アナベイン注7.5mg/mL | 150mg20mL/A |
| 院内 | アネキセート注射液0.5mg | 0.5mg5mL/A |
| 院内 | アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg100mL/瓶 |
| 院内 | アノーロエリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院内 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg4mL/V |
| 院内 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg16mL/V |
| 院内 | アブストラル舌下錠100 μ g | 100 μ g/T（フェンタニルとして） |
| 院内 | アブストラル舌下錠200 μ g | 200 μ g/T（フェンタニルとして） |
| 院内 | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg/V |
| 院内 | アプレゾリン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | アプレゾリン注射用20mg | 20mg/A |
| 院内 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 80mg/cap |
| 院内 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 125mg/cap |
| 院内 | アベロックス錠400mg | 400mg/T |
| 院内 | アマリール1mg錠 | 1mg/T |
| 院内 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 100mg/T |
| 院内 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg3mL/A |
| 院内 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | 200mg2mL/A |
| 院内 | アミティーザカプセル12 μ g | 12 μ g/cap |
| 院内 | アミティーザカプセル24 μ g | 24 μ g/cap |
| 院内 | アミノレバン点滴静注 | 500mL/袋 |
| 院内 | アミノレバンEN配合散 50g（フルーツ味、コーヒー味） | 50g/包 |
| 院内 | アミバレン輸液 | 200mL/袋 |
| 院内 | アムピゾーム点滴静注用50mg | 50mg/V |
| 院内 | アムロジピンOD錠5mg「NP」 | 5mg/T |
| 院内 | アメナリーフ錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 250mg/cap |
| 院内 | アラグリオ内用剤1.5g | 1.5g/V |
| 院内 | アリナミンF50注 | 50mg20mL/A（フルスルチアミンとして） |
| 院内 | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | 10mg2mL/A |
| 院内 | アルサルミン細粒90% | 900mg1g/包 |
| 院内 | アルツディスボ関節注25mg | 25mg2.5mL/本 |
| 院内 | アルドメット錠250 | 250mg/T |
| 院内 | アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」 | 0.25 μ g/T |
| 院内 | アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」 | 1 μ g/T |
| 院内 | アルプミナー5%静注12.5g/250mL | 12.5g250mL/V |
| 院内 | アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 0.4mg/T |
| 院内 | アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」 | 10 μ g2mL/A |
| 院内 | アルロイドG内用液5% | 5g/100mL |
| 院内 | アレジオン錠20 | 20mg/T |
| 院内 | アレックスビー筋注用 | 120 μ g/V（溶解液付） |
| 院内 | アレビアチン散10% | 100mg/g |
| 院内 | アレビアチン注250mg | 250mg5mL/A |
| 院内 | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 | 1mL1瓶 |
| 院内 | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | 20mg2mL/V |
| 院内 | アレロック顆粒0.5% | 2.5mg0.5g/包 |
| 院内 | アロカリス点滴静注235mg | 235mg10mL/V |
| 院内 | アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | 100mg/T |
| 院内 | アンチレクス静注10mg | 10mg1mL/A |
| 院内 | アンテバート軟膏0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院内 | アンブラーグ錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | アンプロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 45mg/T |
| 院内 | アンベック坐剤10mg | 10mg/個 |
| 院内 | EOB・プリモビスト注シリンジ | 18.143%10mL1筒 |
| 院内 | イオバミドール300注20mL「F」 | 61.24%20mL/V（I：300mg/mL） |
| 院内 | イオバミドール300注50mL「F」 | 61.24%50mL/V（I：300mg/mL） |
| 院内 | イオバミドール300注100mL「F」 | 61.24%100mL/V（I：300mg/mL） |
| 院内 | イオバミドール370注50mL「F」 | 75.52%50mL/V（I：370mg/mL） |
| 院内 | イオバミドール370注100mL「F」 | 75.52%100mL/V（I：370mg/mL） |
| 院内 | イオバミロン注150 | 30.62%50mL/V（I：150mg/mL） |
| 院内 | イオバミロン注300シリンジ | 61.24%100mL/筒（I：300mg/mL） |
| 院内 | イオバミロン注370シリンジ | 75.52%100mL/筒（I：370mg/mL） |
| 院内 | イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 | 62.34%100mL/筒（I：300mg/mL） |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--------------------------------|---------------------------|
| 院内 | イクスタンジ錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | イクスタンジ錠80mg | 80mg/T |
| 院内 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | 25mg/T |
| 院内 | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 900mg/包 |
| 院内 | イスコチン錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | イソジンゲル10% | 10%4g/本 |
| 院内 | イソジンシュガーバスタ軟膏 | 100g/本、500g/本 |
| 院内 | イソゾール注射用0.5g | 500mg/V（溶解液付） |
| 院内 | イソバイドシロップ70%分包30mL | 21.0g30mL/包 |
| 院内 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 20mg/T |
| 院内 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 | （一般診断用・1人用）0.25μg/V（溶解液付） |
| 院内 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | 1%140mL/V |
| 院内 | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg/キット |
| 院内 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | 300g/袋 |
| 院内 | イノバン注0.3%シリンジ | 150mg50mL/筒 |
| 院内 | イノラス配合経腸用液 | 187.5mL/パウチ |
| 院内 | イブランス錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | イブランス錠125mg | 125mg/T |
| 院内 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg1.17mL/筒 |
| 院内 | イミグラン錠50 | 50mg/T |
| 院内 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 0.1mg/T |
| 院内 | イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg2.4mL/V |
| 院内 | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg10mL/V |
| 院内 | イムノブラダー膀胱注用80mg | 80mg/V（溶解液付） |
| 院内 | イムラン錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | イモバックスボリオ皮下注 | 0.5mL/筒 |
| 院内 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 | 40mg2mL/V |
| 院内 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 | 100mg5mL/V |
| 院内 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 100mg/T |
| 院内 | イレッサ錠250 | 250mg/T |
| 院内 | インクレミンシロップ5% | 50mg（鉄として6mg）/mL |
| 院内 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg5mL/A |
| 院内 | インスリングルギンBS注ミリオベン「リリー」 | 300単位3mL/キット |
| 院内 | インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 | 300単位/キット |
| 院内 | インタール吸入液1% | 20mg2mL/A |
| 院内 | インデラル錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | インデラル注射液2mg | 2mg2mL/A |
| 院内 | イントラリボス輸液20% | 20%100mL/袋 |
| 院内 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg/V |
| 院内 | インフルエンザHAワクチン | 0.5mL/V |
| 院内 | インライタ錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | インライタ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ヴィーン3G輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ヴィーンF輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ヴィーンD輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ヴォトリエント錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ウチダのオウギ末M | 500g/本 |
| 院内 | ウテメリン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ウブレチド錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ウラリット-U配合散 | 1g/包 |
| 院内 | ウリアデック錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | ウルソ顆粒5% | 50mg/g |
| 院内 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」 | 100mg/T |
| 院内 | ウルティプロ吸入用カプセル | 1cap |
| 院内 | ウロカルン錠225mg | 225mg/T |
| 院内 | ウログラフィン注60% | 60%20mL/A（I：292mg/mL） |
| 院内 | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位/V |
| 院内 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3%3L/袋 |
| 院内 | ATP注20mg「イセイ」 | 20mg2mL/A |
| 院内 | 液状フェノール「ケンエー」 | 88.0%以上500mL/本 |
| 院内 | エクセグラン散20% | 200mg/g |
| 院内 | エクセグラン錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | エクラープラスター-20μg/cm ² | （1.5mg）7.5cm×10cm |
| 院内 | エコリシン眼軟膏 | 3.5g/本 |
| 院内 | エサンブートール錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | エスクレ注腸用キット「500」 | 500mg1340mg/キット |
| 院内 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1mg/T |
| 院内 | SPトローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg/T |
| 院内 | エスボー皮下用24000シリンジ | 24,000IU.0.5mL/筒 |
| 院内 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20mg/T（テガフル相当量） |
| 院内 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25mg/T（テガフル相当量） |
| 院内 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 10mg/T |
| 院内 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg/cap |
| 院内 | エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」 | 30mg/袋 |
| 院内 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 0.5mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--------------------------------|--------------------------|
| 院内 | エトキシスクレロール1%注射液 | 0.3g30mL/V |
| 院内 | エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 | 100mg5mL/V |
| 院内 | エナジア吸入用カプセル高用量 | 1cap |
| 院内 | エナジア吸入用カプセル中用量 | 1cap |
| 院内 | エナラプリルマレイン 塩酸錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg/T |
| 院内 | エネマスター 注腸散 | 400g/袋 |
| 院内 | エバシールド筋注セット | 1セット |
| 院内 | エバデールEMカプセル2g | 2g/包 |
| 院内 | エバミール錠1.0 | 1mg/T |
| 院内 | エビプロスタット配合錠DB | 1錠 |
| 院内 | エビベン注射液0.15mg | 0.15mg |
| 院内 | エビベン注射液0.3mg | 0.3mg |
| 院内 | エビリファイOD錠3mg | 3mg/T |
| 院内 | エビリファイOD錠12mg | 12mg/T |
| 院内 | エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」 | 10mg/V |
| 院内 | エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 | 50mg/V |
| 院内 | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg/T |
| 院内 | エフィエントOD錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg | 40mg1mL/A |
| 院内 | エプクルーサ配合錠 | 1錠 |
| 院内 | エフビーOD錠2.5 | 2.5mg/T |
| 院内 | エブランチルカプセル15mg | 15mg/cap |
| 院内 | エホチール注10mg | 10mg1mL/A |
| 院内 | MSコンチン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | エムラクリーム | 5g/本 |
| 院内 | エリキューズ錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院内 | エリキューズ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | エリスロシンドライシロップW20% | 200mg/g |
| 院内 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | 1000 μ g5mL/筒 |
| 院内 | エルシトニン注40単位 | 40単位/A |
| 院内 | エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」 | 0.75 μ g/cap |
| 院内 | エルネオバNF1号輸液 | 1000mL/袋 |
| 院内 | エルネオバNF1号輸液 | 1500mL/袋 |
| 院内 | エルネオバNF2号輸液 | 1000mL/袋 |
| 院内 | エルネオバNF2号輸液 | 1500mL/袋 |
| 院内 | エルプラット点滴静注液50mg | 50mg10mL/V |
| 院内 | エルプラット点滴静注液100mg | 100mg20mL/V |
| 院内 | エレンタール配合内用剤 | 80g/包 |
| 院内 | 塩化カリウム「フソー」 | 未 |
| 院内 | 塩化Na補正液2.5mEq/mL | 2.922g (2.5mol/L) 20mL/A |
| 院内 | エンタイピオ点滴静注用300mg | 300mg/V |
| 院内 | エンタイピオ皮下注108mgペン | 108mg0.68mL/キット |
| 院内 | エンハーツ点滴静注用100mg | 100mg/V |
| 院内 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 50mg1.0mL/キット |
| 院内 | エンレスト錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | エンレスト錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | オイラックスクリーム10% | 10%10g/本 |
| 院内 | オイラックスHクリーム | 10g/本 |
| 院内 | オーグメンチン配合錠250RS | 1錠 |
| 院内 | オーツカMV注 | 1組 |
| 院内 | 大塚塩カル注2% | 400mg20mL/A |
| 院内 | 大塚蒸留水 | 20mL/A |
| 院内 | 大塚蒸留水 | 100mL/本 |
| 院内 | 大塚蒸留水 | 500mL/本 |
| 院内 | 大塚蒸留水 | 1L/本（広口開栓） |
| 院内 | 大塚食塩注10% | 10%20mL/A |
| 院内 | 大塚生食注 | 20mL/A |
| 院内 | 大塚生食注 | 50mL/V |
| 院内 | 大塚生食注 | 100mL/V |
| 院内 | 大塚生食注 | 250mL/袋 |
| 院内 | 大塚生食注 | 500mL/V（細口開栓） |
| 院内 | 大塚生食注 | 1L/V（広口開栓） |
| 院内 | 大塚糖液5% | 5%20mL/A |
| 院内 | 大塚糖液5% | 5%50mL/V |
| 院内 | 大塚糖液5% | 5%100mL/V |
| 院内 | 大塚糖液5% | 5%250mL/袋 |
| 院内 | 大塚糖液5% | 5%500mL/袋 |
| 院内 | 大塚糖液10% | 10%500mL/袋 |
| 院内 | 大塚糖液50% | 50%200mL/袋 |
| 院内 | オキサロール軟膏25 μ g/g | 0.0025%10g/本 |
| 院内 | オキシコンチンTR錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | オキシコンチンTR錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | オキシドール「ヨシダ」 | 2.5～3.5w/v% |
| 院内 | オキナゾール腔錠600mg | 600mg/T |
| 院内 | オキノーム散5mg | 5mg1g/包 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 院内 | オキノーム散20mg | 20mg1g/包 |
| 院内 | オキファスト注10mg | 10mg1mL/A |
| 院内 | オキファスト注50mg | 50mg5mL/A |
| 院内 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 | 100 μ g1mL/A |
| 院内 | オザグレルNa注射用20mg「SW」 | 20mg/V |
| 院内 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1.5mg0.75mL/本 |
| 院内 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75mg/cap |
| 院内 | オゼンピック皮下注2mg | 2mg1.5mL/キット |
| 院内 | オニバイド点滴静注43mg | 43mg10mL/V |
| 院内 | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg/V |
| 院内 | オノンカプセル112.5mg | 112.5mg/cap |
| 院内 | オノンドライシロップ10% | 100mg/g |
| 院内 | オビソート注射用0.1g | 100mg/A（溶解液付） |
| 院内 | オフェブカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院内 | オフェブカプセル150mg | 150mg/cap |
| 院内 | オフサグリーン静注用25mg | 25mg/V（溶解液付） |
| 院内 | オブジーゴ点滴静注120mg | 120mg |
| 院内 | オブジーゴ点滴静注240mg | 240mg24mL/V |
| 院内 | オブソ内服液5mg | 5mg2.5mL/包 |
| 院内 | オブソ内服液10mg | 10mg5mL/包 |
| 院内 | オベガードMA眼濯流液 | 20mL/A |
| 院内 | オベガードMA眼濯流液 | 300mL/袋 |
| 院内 | オムニパーク240注10mL | 51.77%10mL/V（l：240mg/mL） |
| 院内 | オムニパーク240注シリンジ100mL | 51.77%100mL/筒（l：240mg/mL） |
| 院内 | オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL/筒（l＝300mg/mL） |
| 院内 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg/V |
| 院内 | オラネジン消毒液1.5% 200mL | 200mL/V |
| 院内 | オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」 | 2.5mg/T |
| 院内 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg/T |
| 院内 | オリブ油「ヨシタ」（滅菌済） | 25mL, 60mL |
| 院内 | オルケディア錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | オルダミン注射用1g | 10%10g/V |
| 院内 | オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g/缶 56回（1回吸入量：100 μ g） |
| 院内 | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 11.2mg3.3g/缶 56回（1回吸入量：200 μ g） |
| 院内 | オルミエント錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | オルミエント錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20mg/T |
| 院内 | オレンシア点滴静注用250mg | 250mg/V（調製専用シリンジ付き） |
| 院内 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125mg1mL/キット |
| 院内 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg/T |
| 院内 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | オンコピン注射用1mg | 1mg/V |
| 院内 | オンプレス吸入用カプセル150 μ g | 150 μ g/cap |
| 院内 | ガスター注射液20mg | 20mg2mL/A |
| 院内 | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100mL/本（l：370mg/mL） |
| 院内 | ガチフロ点眼液0.3% | 5mL/本 |
| 院内 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 60.47%7.5mL/筒 |
| 院内 | ガナトン錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg/cap |
| 院内 | カバサル錠1.0mg | 1mg/T |
| 院内 | カプトリル錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | カベンタピン錠300mg「ヤクルト」 | 300mg/T |
| 院内 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg/T |
| 院内 | カリメート経口液20% | 5.0g25g/包 |
| 院内 | カルグート錠10 | 10mg/T |
| 院内 | カルセド注射用20mg | 20mg/瓶 |
| 院内 | カルセド注射用50mg | 50mg/瓶 |
| 院内 | カルチコール注射液8.5%5mL | 425mg5mL/A |
| 院内 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 2%2.5mL/本 |
| 院内 | カルデナリンOD錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | カルナクリン錠50 | 50単位/T |
| 院内 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 30mg/T |
| 院内 | カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 | 100mg20mL/A |
| 院内 | カルベジローレル錠1.25mg「サワイ」 | 1.25mg/T |
| 院内 | カルベジローレル錠10mg「DSEP」 | 10mg/T |
| 院内 | カルボカインアンブル注1% | 100mg10mL/A |
| 院内 | カルボカインアンブル注2% | 200mg10mL/A |
| 院内 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 50mg/mL |
| 院内 | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | 50%1.0g/包 |
| 院内 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 500mg/T |
| 院内 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg5mL/V |
| 院内 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg15mL/V |
| 院内 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 450mg45mL/V |
| 院内 | カロナール細粒20% | 200mg/g |
| 院内 | カロナール錠200 | 200mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|------------------------------------|---|
| 院内 | カロナール錠500 | 500mg/T |
| 院内 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 5g/本 |
| 院内 | ガンシクロビル点滴静注用500mg〔VTRS〕 | 500mg/V |
| 院内 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位〔ニチャク〕 | 200単位/V（溶解液として注射用水1mLを添付） |
| 院内 | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位〔ニチャク〕 | 1,000単位/V（溶解液として注射用水5mLを添付） |
| 院内 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 弱毒生ムンプスウイルス（宮原株）5,000CCID50以上/V（溶解液付） |
| 院内 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 弱毒生水痘ウイルス（岡株）1000PFU以上/V（溶解液付） |
| 院内 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 弱毒生風しんウイルス（TO-336株）1,000PFU以上/V（溶解液付） |
| 院内 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | 弱毒生麻しんウイルス（シュワルツFF-8株）5,000CCID50以上/V（溶解液付） |
| 院内 | 乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） | 12mg/A |
| 院内 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 8mg/T |
| 院内 | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg/V |
| 院内 | キシロカインゼリー2% | 2%30mL/本 |
| 院内 | キシロカインビスカス2% | 2%100mL/本 |
| 院内 | キシロカイン液「4%」 | 4%100mL/本 |
| 院内 | キシロカイン注シリンジ0.5% | 50mg10mL/筒 |
| 院内 | キシロカイン注シリンジ1% | 100mg10mL/筒 |
| 院内 | キシロカイン注ボリアンプ0.5% | 50mg10mL/A |
| 院内 | キシロカイン注ボリアンプ1% | 100mg10mL/A |
| 院内 | キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン（1：100,000）含有 | 100mg20mL/V |
| 院内 | キシロカイン注射液「1%」エビレナミン（1：100,000）含有 | 200mg20mL/V |
| 院内 | キシロカイン注射液「2%」エビレナミン（1：80,000）含有 | 400mg20mL/V |
| 院内 | キシロカイン点眼液4% | 4%20mL/本 |
| 院内 | キシロカインポンプスプレー8% | 80g/本 |
| 院内 | キックリンカプセル250mg | 250mg/cap |
| 院内 | キネダック錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | キプレス細粒4mg | 4mg/包 |
| 院内 | 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 | 0.025w/v%250mL/本 |
| 院内 | ギャバロン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL | 20mL/A |
| 院内 | キンダリー透析剤5E | A剤3004.8g/袋・B剤882.0g/袋 |
| 院内 | キンダリー透析剤AF5号 | A液6L/本・B液7.56L/本 |
| 院内 | クアトロバック皮下注シリンジ | 0.5mL/筒 |
| 院内 | グーフィス錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | クエチアピン錠25mg「明治」 | 25mg/T |
| 院内 | クエチアピン錠100mg「明治」 | 100mg/T |
| 院内 | グラケーカプセル15mg | 15mg/cap |
| 院内 | クラシエ十全大補湯エキス細粒（EK-48） | 2.5g/包 |
| 院内 | クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒（KB-14）、〔EK-14〕 | 2.0g/包 |
| 院内 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（EK-68） | 2g/包 |
| 院内 | グラニセトロン静注液1mg「明治」 | 1mg1mL/A |
| 院内 | グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | 2mg（グラニセトロンとして）2g/包 |
| 院内 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 | 100mg/g |
| 院内 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 200mg/T |
| 院内 | グランダキシン錠50 | 50mg/T |
| 院内 | クリアクター静注用80万 | 80万I.U./V |
| 院内 | クリアナール錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | グリセオール注 | 200mL/袋 |
| 院内 | グリセリン流腸液50%「ケンエー」 | 50%30mL/個 |
| 院内 | グリセリン流腸液50%「ケンエー」 | 50%60mL/個 |
| 院内 | グリセリン流腸液50%「ケンエー」 | 50%120mL/個 |
| 院内 | グリセリンシオエ | 84.0～87.0%500mL/本 |
| 院内 | グリセリンBC液「ヨシダ」 | 84.0～87.0%：100mL/V |
| 院内 | グリチロン配合錠 | 1錠 |
| 院内 | グリミクロン錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1mg（1I.U.）/V（溶解液付） |
| 院内 | グルコンサンK細粒4mEq/g | 937mg（K含量4mEq相当量）/g |
| 院内 | グルコンサンK錠5mEq | 1170mg（K含量5mEq相当量）/T |
| 院内 | クレキサン皮下注キット2000IU | 2000I.U.（抗第Xa因子活性）0.2mL/筒 |
| 院内 | クレメジン速崩錠500mg（4錠/包） | 500mg/T |
| 院内 | クロビドグレル錠25mg「SANIK」 | 25mg/T |
| 院内 | クロビドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg/T |
| 院内 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%5g/本 |
| 院内 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 0.05%10g/本 |
| 院内 | クロマイ錠錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ケイキサレートドライシロップ76% | 76%3.27g/包 |
| 院内 | KCL注20mEqキット「テルモ」 | 1.491g20mL/キット |
| 院内 | ケイセントラ静注用500 | 500U./V |
| 院内 | ケイセントラ静注用1000 | 1000U./V |
| 院内 | ケイツーシロップ0.2% | 2mg/mL 1mL/包 |
| 院内 | ケイツーN静注10mg | 10mg2mL/A |
| 院内 | ゲーベンクリーム1% | 1%50g/本 |
| 院内 | ゲーベンクリーム1% | 1%500g/個 |
| 院内 | ケサンラ点滴静注液350mg | 350mg20mL/V |
| 院内 | ケタスカプセル10mg | 10mg/cap |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 院内 | ケタール静注用200mg | 200mg20mL/V |
| 院内 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 40mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚） |
| 院内 | ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg1mL/V |
| 院内 | ケプザラ皮下注150mgオートインジェクター | 150mg1.14mL/キット |
| 院内 | ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg1.14mL/キット |
| 院内 | ケフラル細粒小児用100mg | 100mg/g |
| 院内 | ケフレックスカプセル250mg | 250mg/Cap |
| 院内 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 200mg/V |
| 院内 | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1g/V |
| 院内 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 20%25g/本 |
| 院内 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 | 12.5g50mL/V |
| 院内 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 2.5g/25mL |
| 院内 | 献血グロベニン－I静注用2500mg | 2.5g/V（溶解液付） |
| 院内 | 献血ベニコロン－I静注用2500mg | 2.5g/V（溶解液付） |
| 院内 | ゲンタシン注60 | 60mg1.5mL/A |
| 院内 | ゲンタシン軟膏0.1% | 0.1%10g/本 |
| 院内 | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg/V |
| 院内 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 1,000倍/V（溶解液付） |
| 院内 | コートリル錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | ゴベック水性懸濁注シリンジ | 0.5mL/筒 |
| 院内 | コセンティクス皮下注150mgペン | 150mg1mL/キット |
| 院内 | コソプト配合点眼液 | 5mL/本 |
| 院内 | コデインリン酸塩散1%「メタル」 | 10mg/g |
| 院内 | ゴナックス皮下注用80mg | 80mg/V（溶解液付き） |
| 院内 | ゴナックス皮下注用120mg | 120mg/V（溶解液付き） |
| 院内 | コバシル錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | コムタン錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | コメリアンコーワ錠50 | 50mg/T |
| 院内 | コララン錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院内 | コララン錠7.5mg | 7.5mg/T |
| 院内 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg/T |
| 院内 | コレクチム軟膏0.5% | 0.5%5g/本 |
| 院内 | コレバインミニ83% | 83%1.81g/包 |
| 院内 | コントミン筋注10mg | 10mg2mL/A |
| 院内 | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg/T |
| 院内 | サアミオン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ザイザルシロップ0.05% | 0.5mg/mL |
| 院内 | ザイティガ錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | サイプレジン1%点眼液 | 1%10mL/本 |
| 院内 | ザイボックス注射液600mg | 600mg300mL/本 |
| 院内 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg10mL/V |
| 院内 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg50mL/V |
| 院内 | サイレース錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | サイレース静注2mg | 2mg1mL/A |
| 院内 | 酢酸「ニココー」 | 500mL/瓶 |
| 院内 | サノレックス錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院内 | サフネロー点滴静注300mg | 300mg2mL/V |
| 院内 | サフバック血液ろ過用補充液－Bi | 2020mL/袋 |
| 院内 | サムチレール内用懸濁液15% | 750mg5mL/包 |
| 院内 | ザラカム配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院内 | サラジェン顆粒0.5% | 5mg・1g/包 |
| 院内 | サラゾピリン錠500mg | 500mg/T |
| 院内 | サリグレンカプセル30mg | 30mg/cap |
| 院内 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 10%500g/瓶 |
| 院内 | ザルコニン液0.05 | 0.05w/v%1L/本 |
| 院内 | ザルコニン液10 | 10w/v%500mL/本 |
| 院内 | サルタノールインヘラー100μg | 0.16%13.5mL/本 |
| 院内 | ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg/瓶 |
| 院内 | ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg/瓶 |
| 院内 | サワシリン細粒10% | 100mg/g |
| 院内 | サンコバ点眼液0.02% | 0.02%5mL/本 |
| 院内 | サンピロ点眼液2% | 2%5mL/本 |
| 院内 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | 5%250g/本 |
| 院内 | サンリズムカプセル50mg | 50mg/cap |
| 院内 | サンリズム注射液50 | 50mg5mL/A |
| 院内 | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド | 3.6mg0.36mL/キット |
| 院内 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg/V（溶解液付） |
| 院内 | ジアゼパム錠2「トーワ」 | 2mg/T |
| 院内 | シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 10mg/mL |
| 院内 | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.6mg/筒 |
| 院内 | ジェイゾロフトOD錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | ジェービックV | 不活化日本脳炎ウイルス北京株 参照品（力価）と同等以上/本 |
| 院内 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 1mg/T |
| 院内 | ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg1.5mL/V |
| 院内 | ジオトリフ錠30mg | 30mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------|----------------------|
| 院内 | ジオトリフ錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | ジギラノゲン注0.4mg | 0.4mg2mL/A |
| 院内 | ジクアス点眼液3% | 3%5mL/本 |
| 院内 | ジクトルテープ75mg | 75mg/枚 |
| 院内 | シグマート注2mg | 2mg/V |
| 院内 | シグマート注48mg | 48mg/V |
| 院内 | シクレスト舌下錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | シクロスボリンカプセル25mg「サンド」 | 25mg/cap |
| 院内 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 25mg/個 |
| 院内 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 50mg/個 |
| 院内 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 10mg20mL/V |
| 院内 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | 50mg100mL/V |
| 院内 | ジスロマック錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg/V |
| 院内 | ジセレ力錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 2000JAU/T |
| 院内 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 5000JAU/T |
| 院内 | シナジス筋注液100mg | 100mg1mL/V |
| 院内 | シナジス筋注液50mg | 50mg0.5mL/V |
| 院内 | ジビリダモール錠25mg「トーワ」 | 25mg/T |
| 院内 | ジビリダモール錠100mg「トーワ」 | 100mg/T |
| 院内 | ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 0.05%5g/本 |
| 院内 | シプロキシサン錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | シプロフロキシサン点滴静注液400mg「ニプロ」 | 400mg200mL/袋 |
| 院内 | シベノール錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | シベノール静注70mg | 70mg5mL/A |
| 院内 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | 200mg1mL/筒 |
| 院内 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | 60吸入/本 |
| 院内 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 40mg/T |
| 院内 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 20mg/mL・300mL |
| 院内 | ジャディアンス錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | ジャスピア錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | 重質酸化マグネシウムシオエ | バラ包装のみ |
| 院内 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 40mg/枚 |
| 院内 | 硝酸銀「VTRS」原末 | 100%25g/本 |
| 院内 | 静注用キシロカイン2% | 100mg5mL/A |
| 院内 | 静注用マグネゾール20mL | 20mL/A |
| 院内 | 消毒用エタノール液IP | 76.9～81.4vol%500mL/本 |
| 院内 | D T ビック（沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド） | 1mL/V |
| 院内 | 消毒用エタプラス 500mL | 500mL/V |
| 院内 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 0.3% 3mg/mL |
| 院内 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 1.5% 15mg/g |
| 院内 | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | 0.5mL/筒 |
| 院内 | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 100mg/T |
| 院内 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg/T |
| 院内 | シングリックス筋注用 | 0.5mL/筒 |
| 院内 | シングレアチュアブル錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL/本 |
| 院内 | シンボニー皮下注50mgシリンジ | 50mg0.5mL/筒 |
| 院内 | シンメトレル錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | 新レシカルボン坐剤 | 1個 |
| 院内 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg | 100mg2mL/V |
| 院内 | 水溶性ブレドニン10mg | 10mg/A |
| 院内 | スインブロイク錠0.2mg | 0.2mg/T |
| 院内 | スーグラ錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | スーブレン吸入麻酔液 | 240mL/瓶 |
| 院内 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200mg2mL/筒 |
| 院内 | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL | 150mg |
| 院内 | スクラルファート内用液10%「NIG」 | 1g10mL/包 |
| 院内 | スコビゾル眼科用液 | 15mL/本 |
| 院内 | ステリクロンW液0.02 | 0.02%500mL/本 |
| 院内 | ステリクロンW液0.05 | 0.05%500mL/本 |
| 院内 | ステリクロンW液0.1 | 0.1%500mL/本 |
| 院内 | ストロメクトール錠3mg | 3mg/T |
| 院内 | スピオルトレスビマット 60吸入 | 60吸入/キット |
| 院内 | スピリーバ2.5μgレスビマット60吸入 | 2.5μg60吸入/本 |
| 院内 | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 25mg/T |
| 院内 | スピロベント錠10μg | 10μg/T |
| 院内 | ズファジラン筋注5mg | 5mg1mL/A |
| 院内 | ズファジラン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | スミスリンローション5% | 50mg/g |
| 院内 | スルバシリン静注用1.5g | 1.5g/V |
| 院内 | 生食注シリンジ「オーツカ」 20mL | 0.18g20mL/筒 |
| 院内 | 生食注シリンジ「テルモ」 10mL | 0.9w/v%10mL/筒 |
| 院内 | 生食溶解液キットH | 0.9g100mL/キット |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-------------------------|---|
| 院内 | セイブル錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 250mL/袋 |
| 院内 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 500mL/袋 |
| 院内 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1500mL/袋 |
| 院内 | 生理食塩液PL「フソー」 | 2L/袋 |
| 院内 | セバミット-R細粒2% | 10mg/0.5g/包 |
| 院内 | ゼビュディ点滴静注500mg | 500mg/瓶 |
| 院内 | セファクロカプセル250mg「SW」 | 250mg/Cap |
| 院内 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | 1g/V |
| 院内 | セファドール錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g/V |
| 院内 | セフォタックス注射用0.5g | 0.5g/V |
| 院内 | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | 1g/V |
| 院内 | セフタジジム静注用1g「VTRS」 | 1g/V |
| 院内 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g/V |
| 院内 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g/V |
| 院内 | セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」 | 250mL/瓶 |
| 院内 | セララ錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | セルタッチパップ70 | 70mg14.0g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：6枚） |
| 院内 | ゼルフォーム | 2cm×6cm×0.7cm/枚 |
| 院内 | ゼルヤンツ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 100mg/T |
| 院内 | セレジストOD錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | セレストミン配合錠 | 1錠 |
| 院内 | セレニカR顆粒40% | 400mg/g |
| 院内 | セレネース錠0.75mg | 0.75mg/T |
| 院内 | セレネース注5mg | 5mg1mL/A |
| 院内 | セロクラール錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 12mg/T |
| 院内 | ソセゴン注射液15mg | 15mg1mL/A |
| 院内 | ソナゾイド注射用16μL | 16μL/V |
| 院内 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 25mg/T |
| 院内 | ゾピラックス眼軟膏3% | 3%5g/本 |
| 院内 | ソフラチュール貼付剤10cm | (10.8mg) 10cm×10cm/枚 |
| 院内 | ゾラデックス3.6mgデボ | 3.6mg/筒（ゴセレリンとして） |
| 院内 | ゾラデックスLA10.8mgデボ | 10.8mg/筒（ゴセレリンとして） |
| 院内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 | 5mg/T |
| 院内 | ソル・メドロール静注用40mg | 40mg/V（溶解液付） |
| 院内 | ソル・メドロール静注用500mg | 500mg/V（溶解液付） |
| 院内 | ソルダクトン静注用200mg | 200mg/A |
| 院内 | ソルデム1輸液 | 200mL/袋 |
| 院内 | ソルデム1輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ソルデム3A輸液 | 200mL/袋 |
| 院内 | ソルデム3A輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 3mL/筒 |
| 院内 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg/T |
| 院内 | ソルベース | 500g/本 |
| 院内 | ソラクト輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ゾレア皮下注75mgベン | 75mg0.5mL/キット |
| 院内 | ゾレア皮下注150mgベン | 150mg1mL/キット |
| 院内 | ゾレア皮下注300mgベン | 300mg2mL/キット |
| 院内 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 4mg/瓶 |
| 院内 | ダーブロック錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | ダイアアップ坐剤4 | 4mg/個 |
| 院内 | ダイアモックス錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | ダイアモックス注射用500mg | 500mg/V |
| 院内 | 高砂サフランM | |
| 院内 | タグリッソ錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | タグリッソ錠80mg | 80mg/T |
| 院内 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 0.5mg/T |
| 院内 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 1mg/T |
| 院内 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 1.5mg/T |
| 院内 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 3mg/T |
| 院内 | タケキャブOD錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | タケキャブOD錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | タケブロン静注用30mg | 30mg/V |
| 院内 | タコシール組織接着用シート | 4.8cm×4.8cm/枚 |
| 院内 | タコシール組織接着用シート | 9.5cm×4.8cm/枚 |
| 院内 | タゾビペ配合静注用4.5「明治」 | 4.5g/V |
| 院内 | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 5mg/T |
| 院内 | ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | 350mg/V（調製時の損失を考慮に入れ、1バイアル中367.5mgを含む。） |
| 院内 | タミフルドライシロップ3% | 30mg/g |
| 院内 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 0.2mg/T |
| 院内 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 20mg/T |
| 院内 | ダラシнкаプセル150mg | 150mg/cap |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------------|--------------------|
| 院内 | ダラシンS注射液600mg | 600mg4mL/A |
| 院内 | タリージェOD錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院内 | タリージェOD錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | タリビッド眼軟膏0.3% | 0.3%3.5g/本 |
| 院内 | タリビッド耳科用液0.3% | 0.3%5mL/本 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注5 μ gシリンジ「KKF」 | 5 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注10 μ gシリンジ「KKF」 | 10 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 | 20 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 | 30 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注40 μ gシリンジ「KKF」 | 40 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 | 60 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 | 120 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | ダルベゴエチンアルファ注180 μ gシリンジ「KKF」 | 180 μ g0.5mL/筒 |
| 院内 | 炭酸水素ナトリウムシオエ | 未 |
| 院内 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 250mg/T |
| 院内 | 単シロップシオエ | 500mL/本 |
| 院内 | ダントリウムカプセル25mg | 25mg/cap |
| 院内 | ダントリウム静注用20mg | 20mg/V |
| 院内 | タンニン酸アルブミンシオエ | 未 |
| 院内 | タンボコール錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 25mg/T |
| 院内 | チウラジール錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | チガソнкаプセル10 | 10mg/cap |
| 院内 | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 0.5%5mL/本 |
| 院内 | チモロールXE点眼液0.5%「TS」 | 0.5%2.5mL/本 |
| 院内 | 注射用エンドキサン500mg | 500mg/V |
| 院内 | 注射用水 | 500mL/V |
| 院内 | 調剤用バンピタン末 | 100g/本 |
| 院内 | チラーゼンS散0.01% | 0.1mg/g |
| 院内 | チラーゼンS錠50 μ g | 50 μ g/T |
| 院内 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500mg/T |
| 院内 | 沈降破傷風トキシイド「生研」 | 0.5mL/V（20Lf以下/mL） |
| 院内 | ツイミーク錠500mg | 500mg/T |
| 院内 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-135〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-28〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-15〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-137〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-138〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-50〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-134〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-25〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）〔TJ-125〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-96〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-114〕 | 3g/包 |
| 院内 | ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）〔TJ-35〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-9〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-19〕 | 3g/包 |
| 院内 | ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-30〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）〔TJ-111〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-90〕 | 3.0g/包 |
| 院内 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-84〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-91〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）〔TJ-89〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-40〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）〔TJ-105〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔TJ-23〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ人參養榮湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-108〕 | 3g/包 |
| 院内 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-122〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-29〕 | 3g/包 |
| 院内 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-116〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-20〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔TJ-62〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-41〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-27〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕 | 2.5g/包 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--------------------------------|---------------------------------|
| 院内 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕 | 2.5g/包 |
| 院内 | テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」 | 200mg/V |
| 院内 | ディスオーバ消毒液0.55% | 0.55%3.8L/本 |
| 院内 | ディナゲスト錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | ディフェリンゲル0.1% | 0.1%15g/本 |
| 院内 | 1%ディブリバン注 | 500mg50mL/V |
| 院内 | 1%ディブリバン注－キット | 200mg20mL/本 |
| 院内 | 1%ディブリバン注－キット | 500mg50mL/本 |
| 院内 | 低分子デキストランL注 | 500mL/袋 |
| 院内 | デエピゴ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | テオドール錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院内 | デカドロン錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | デキサート注射液3.3mg | デキサメタゾンとして3.3mg1mL/A |
| 院内 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 0.1mg/mL |
| 院内 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 1mg/g・5g/本 |
| 院内 | テキサント消毒液6% | 6w/v%500g/本 |
| 院内 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 15mg/T |
| 院内 | デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg50mL/筒 |
| 院内 | テグレートール細粒50% | 500mg/g |
| 院内 | テグレートール錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | デスフェール注射用500mg | 500mg/V |
| 院内 | テゼスバイア皮下注210mgペン | 210mg1.91mL/キット |
| 院内 | テセントリク点滴静注840mg | 840mg14mL/V |
| 院内 | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg20mL/V |
| 院内 | タタガムP筋注シリンジ250 | 250IU.1mL/筒 |
| 院内 | タタノブリンH静注1500単位 | 1,500IU.20mL/V |
| 院内 | デトキソール静注液2g | 2g20mL/V |
| 院内 | デノタスチュアブル配合錠 | 1錠 |
| 院内 | デバケンR錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | デプロメール錠25 | 25mg/T |
| 院内 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | 0.5mg/T |
| 院内 | デュタステリド錠0.5mgZA「トーフ」 | 0.5mg/T |
| 院内 | デュビクセント皮下注300mgペン | 300mg2mL/筒 |
| 院内 | デュファストン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 20mg/T |
| 院内 | テラ・コートリル軟膏 | 5g/本 |
| 院内 | テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600μg/キット |
| 院内 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 28.2μg/キット |
| 院内 | テリボン皮下注用56.5μg | 67.9μg（テリバラチドとして63.3μg）/V（溶解液付） |
| 院内 | テリルジー100エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院内 | テリルジー200エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院内 | テルネリン錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 40mg/T |
| 院内 | テルモ生食 | 1000mL/袋 |
| 院内 | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 1錠 |
| 院内 | 動注用アイエーコール50mg | 50mg/V |
| 院内 | ドキシル注20mg | 20mg10mL/V |
| 院内 | ドグマチール細粒10% | 10% 100mg/g |
| 院内 | ドグマチール錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」 | 100mg/cap |
| 院内 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg1mL/瓶 |
| 院内 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg4mL/瓶 |
| 院内 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 3mg/T |
| 院内 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 5mg/T |
| 院内 | ドバコール配合錠L100 | 1錠 |
| 院内 | ドバトン静注25mg | 25mg10mL/A |
| 院内 | トビエース錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | トプシムローション0.05% | 0.05%10g/本 |
| 院内 | ドブスOD錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 | 150mg50mL/筒 |
| 院内 | ドブラム注射液400mg | 400mg20mL/V |
| 院内 | トラセミドOD錠8mg「TEJ」 | 8mg/T |
| 院内 | トラゼンタ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg/T |
| 院内 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 250mg/T |
| 院内 | トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」 | 1000mg/ A |
| 院内 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 0.004%2.5mL/本 |
| 院内 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | 0.118%100mL/瓶 |
| 院内 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg/T |
| 院内 | トリクロロールシロップ10% | 100mg/mL |
| 院内 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 1mg/T |
| 院内 | トリプタノール錠10 | 10mg/T |
| 院内 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 80mg1mL/筒 |
| 院内 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| 院内 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 15mg/T |
| 院内 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75mg/キット |
| 院内 | トレシーバ注フレックスタッチ | 300単位3mL/キット |
| 院内 | ドロレプタン注射液25mg | 25mg10mL/V |
| 院内 | トロンビン液モチダソフトボトル1万 | 10,000単位10mL/キット |
| 院内 | ナイキサン錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ナウゼリン坐剤10 | 10mg/個 |
| 院内 | ナウゼリン坐剤60 | 60mg/個 |
| 院内 | ナウゼリンOD錠10 | 10mg/T |
| 院内 | ナトリックス錠1 | 1mg/T |
| 院内 | ナノゾラ皮下注30mgシリンジ | 30mg0.375mL/筒 |
| 院内 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」 | 10mg/V |
| 院内 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 | 50mg/V |
| 院内 | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」 | 100mg/V |
| 院内 | ナフトピジルOD錠25mg「ニプロ」 | 25mg/T |
| 院内 | ナフトピジルOD錠75mg「ニプロ」 | 75mg/T |
| 院内 | ナルサス錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | ナルサス錠6mg | 6mg/T |
| 院内 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 2.5μg/T |
| 院内 | ナルベイン注2mg | 2mg1mL/A |
| 院内 | ナルラビド錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | ナルラビド錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0.2mg1mL/A |
| 院内 | ニカルギピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 | 10mg10mL/A |
| 院内 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5mg/T |
| 院内 | ニゾラルクリーム2% | 2%10g/本 |
| 院内 | ニトプロ持続静注液6mg | 6mg2mL/A |
| 院内 | ニトロール注5mg | 5mg10mL/A |
| 院内 | ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」 | 25mg50mL/筒 |
| 院内 | ニトロベン舌下錠0.3mg | 0.3mg/T |
| 院内 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | 20mg/T |
| 院内 | ニフレック配合内用剤 | 137.155g/袋 |
| 院内 | 乳酸カルシウム「VTRS」原末 | 未 |
| 院内 | 乳糖水和物「シオエ」 | 未 |
| 院内 | ニュープロバッチ9mg | 9mg/枚 |
| 院内 | ニューモバックスNPシリンジ | 0.5mL/筒 |
| 院内 | ニューロタン錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg/筒 |
| 院内 | ネオアミュー輸液 | 200mL/本 |
| 院内 | ネオンネジンコーワ5%点眼液 | 5%10mL/本 |
| 院内 | ネオンネジンコーワ注1mg | 1mg1mL/A |
| 院内 | ネオピタカイン注シリンジ5mL | 5mL/筒 |
| 院内 | ネオフィリン注250mg | 250mg10mL/A |
| 院内 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 10mg/包 |
| 院内 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 20mg/包 |
| 院内 | ノイアート静注用1500単位 | 1500単位/V（溶解液として注射用水30mL付） |
| 院内 | ノイロトロピン錠4単位 | 4単位/T |
| 院内 | ノイロトロピン注射液3.6単位 | 3mL/A |
| 院内 | ノウリアスト錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | ノーベルバル静注用250mg | 250mg/V |
| 院内 | ノバミン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ノボラビッド注フレックスタッチ | 300単位3mL/筒 |
| 院内 | ノボラビッド注フレックスベン | 300単位3mL/筒 |
| 院内 | ノボリンR注100単位/mL | 1000単位10mL/V |
| 院内 | ノボリンR注フレックスベン | 300単位3mL/筒 |
| 院内 | ノルアドリナリン注1mg | 1mg1mL/A |
| 院内 | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 2.5mg/筒 |
| 院内 | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 5mg/筒 |
| 院内 | パーサビブ静注透析用シリンジ10mg | 10mg/筒 |
| 院内 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | 420mg14mL/V |
| 院内 | ハーセプチン注射用60 | 60mg/V |
| 院内 | ハーセプチン注射用150 | 150mg/V |
| 院内 | ハーフゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg/T |
| 院内 | ハーボニー配合錠 | 1錠 |
| 院内 | バイアスピリン錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ハイカムチン注射用1.1mg | 1.1mg/V |
| 院内 | ハイカリックRF輸液 | 500mL/本 |
| 院内 | ハイシー顆粒25% | 250mg/g |
| 院内 | ハイジール消毒用液10% | 10%500mL/本 |
| 院内 | ハイベン錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | バキシルCR錠12.5mg | 12.5mg/T |
| 院内 | バキロビッドバック300 | 1シート |
| 院内 | バキロビッドバック600 | 1シート |
| 院内 | バクタ配合錠 | 1錠 |
| 院内 | バクタ配合顆粒 | 100g/瓶 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| 院内 | バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 30mg5mL/V |
| 院内 | バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 100mg16.7mL/V |
| 院内 | はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 | 0.5mL/V |
| 院内 | パッチテストパネル（S） | 2枚/組 |
| 院内 | パップフォー錠10 | 10mg/T |
| 院内 | パドセブ点滴静注用30mg | 30mg/V |
| 院内 | バナンドライシロップ5% | 5% 50mg/g |
| 院内 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2,000単位100mL/V |
| 院内 | パベンチオ点滴静注200mg | 200mg10mL/V |
| 院内 | バム静注500mg | 500mg20mL/A |
| 院内 | ハラヴェン静注1mg | 1mg2mL/V |
| 院内 | バラクルード錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院内 | バラシクロピル錠500mg「SPKK」 | 500mg/T |
| 院内 | バラシクロピル顆粒50%「SPKK」 | 500mg/g |
| 院内 | バリブライトP | 98%350g/袋 |
| 院内 | バルサルタン錠80mg「ケミファ」 | 80mg/T |
| 院内 | バルナバリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 4,000低分子量ヘパリン単位20mL/筒 |
| 院内 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 50mg/mL |
| 院内 | バルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg/T |
| 院内 | バルモディアXR錠0.4mg | 0.4mg/T |
| 院内 | バレプラス輸液 | 500mL/キット |
| 院内 | バロス発泡顆粒－S | 5g/包 |
| 院内 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 0.75mg5mL/V |
| 院内 | バンコマイシン塩酸塩0.5g「VTRS」 | 0.5g/V |
| 院内 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 0.5g/V |
| 院内 | バントール注射液500mg | 500mg2mL/A |
| 院内 | バントシン散20% | 200mg/g |
| 院内 | ハンブ注射用1000 | 1,000 μ g/V |
| 院内 | ビ・シフロール錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院内 | ヒアレイン点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 20mL/本 |
| 院内 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | 0.46%20mL/V（希釈液480mL付） |
| 院内 | PL配合顆粒 | 1g/包 |
| 院内 | ビートル顆粒分包250mg | 250mg/包 |
| 院内 | ビーフリード輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ビームゲン注0.5mL | 10 μ g0.5mL/V |
| 院内 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL | 1%0.85mL/筒 |
| 院内 | ビオスミン配合散 | 500g/本 |
| 院内 | ビオスリー配合錠 | 1錠 |
| 院内 | ビオフェルミン錠剤 | 12mg/T |
| 院内 | ビオフェルミンR散 | 6.0mg1g/包 |
| 院内 | ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 80mg/T |
| 院内 | ピクシリン注射用1g | 1g/V |
| 院内 | ピクトーザ皮下注18mg | 18mg3mL/筒 |
| 院内 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 0.75%10mL/本 |
| 院内 | ピジバーク270注20mL | 54.97%20mL/V（I：270mg/mL） |
| 院内 | ピジバーク270注100mL | 54.97%100mL/V（I：270mg/mL） |
| 院内 | ピシパニール注射用5KE | 5KE/瓶 |
| 院内 | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 0.5mL/本 |
| 院内 | ピソノテープ2mg | 2mg/枚 |
| 院内 | ピソノテープ4mg | 4mg/枚 |
| 院内 | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 0.625mg/T |
| 院内 | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg/T |
| 院内 | ピタシミン注射液500mg | 500mg2mL/A |
| 院内 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 2mg/T |
| 院内 | ピタメジン静注用 | 1V |
| 院内 | ピダラビン軟膏3%「SW」 | 3%5g/本 |
| 院内 | ヒダントール錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | ヒダントール錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ピトレシン注射液20 | 20単位1mL/A |
| 院内 | ピノルビン注射用30mg | 30mg/V |
| 院内 | ピピアント錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | ヒピテン・グルコネート液20% | 20%500mL/本 |
| 院内 | ピムバット錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ピムバット錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25mg/T |
| 院内 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 300単位3mL/キット |
| 院内 | ピラノアOD錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | ピラマイド原末 | 未 |
| 院内 | ピリスコピン点滴静注50 | 10.55%100mL/V（I：50mg/mL） |
| 院内 | ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 10mg/T |
| 院内 | ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」 | 50mg/T |
| 院内 | ヒルナミン錠（5mg） | 5mg/T |
| 院内 | ピレーズトリエアロスフィア120吸入 | 120吸入/キット |
| 院内 | ピレチア錠（25mg） | 25mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--|--|
| 院内 | ピロイ点滴静注用100mg | 100mg/V |
| 院内 | ピロイ点滴静注用300mg | 300mg/V |
| 院内 | ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 0.005%5mL/本 |
| 院内 | 5-FU注1000mg | 1000mg20mL/瓶 |
| 院内 | ファセンラ皮下注30mgペン | 30mg1mL/キット |
| 院内 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 20mg/T |
| 院内 | ファロム錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ファンギゾンシロップ 24mL | 100mg/mL |
| 院内 | フィコンバ錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | フィジオ35輸液 | 500mL/袋 |
| 院内 | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg/V |
| 院内 | フィブラストスプレー500 | 500μg/V（溶解液付） |
| 院内 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | 75μg0.3mL/筒 |
| 院内 | フェインジェクト静注500mg | 500mg10mL/V |
| 院内 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg/T |
| 院内 | フェジン静注40mg | 鉄として40mg2mL/A |
| 院内 | フェスゴ配合皮下注MA | 10mL/V |
| 院内 | フェスゴ配合皮下注IN | 15mL/V |
| 院内 | フェソロデックス筋注250mg | 250mg5mL/筒 |
| 院内 | フェノバル散10% | 100mg/g |
| 院内 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 20mg/T |
| 院内 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3%40g/本 |
| 院内 | フェロ・グラデュメット錠105mg | 鉄として105mg/T |
| 院内 | フェロミア顆粒8.3% | 941.8mg（鉄として100mg）/1.2g |
| 院内 | フェロミア錠50mg | 470.9mg（鉄として50mg）/T |
| 院内 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.1mg2mL/A |
| 院内 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.5mg10mL/A |
| 院内 | フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 |
| 院内 | フェントステープ1mg | 1mg/枚 |
| 院内 | フェントステープ2mg | 2mg/枚 |
| 院内 | フェントステープ4mg | 4mg/枚 |
| 院内 | フォシーガ錠10mg | 10mg |
| 院内 | フォリアミン錠 | 5mg/T |
| 院内 | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | 500mL/本 |
| 院内 | ブスコパン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | ブスコパン注20mg | 20mg1mL/A |
| 院内 | フスタゾール糖衣錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | ブドウ糖注50%PL「フソー」 | 50%20mL/A |
| 院内 | ブラケニル錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ブラザキサカプセル110mg | 110mg/cap |
| 院内 | フラジール内服錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | フラジール腔錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | ブラダロン錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ブラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 10mg/T |
| 院内 | ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL | 60mg0.5mL/筒 |
| 院内 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | ブリモラン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 1%5mL/本 |
| 院内 | プリンベランシロップ0.1% | 1mg/mL |
| 院内 | フルオレサイト静注500mg | 500mg5mL/A |
| 院内 | フルカリック3号輸液 | 1103mL/キット |
| 院内 | フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 100mg/cap |
| 院内 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 25mg/T |
| 院内 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 | 27.5μg56噴霧用 6g/本 |
| 院内 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 56吸入/瓶 |
| 院内 | フルメトロン点眼液0.02% | 0.02%5mL/本 |
| 院内 | フルメトロン点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg/T |
| 院内 | ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 75mg/T |
| 院内 | ブレグランディン腔坐剤1mg | 1mg/個 |
| 院内 | ブレディニンOD錠50 | 50mg/T |
| 院内 | ブレドニゾン散「タケダ」1% | 10mg/g |
| 院内 | ブレドニゾン錠「タケダ」5mg | 5mg/T |
| 院内 | ブレドニゾン錠1mg（旭化成） | 1mg/T |
| 院内 | ブレドニン眼軟膏 | 0.25%5g/本 |
| 院内 | ブレベナー20水性懸濁注 | 0.5mL/筒 |
| 院内 | ブレマリン錠0.625mg | 0.625mg/T |
| 院内 | ブレミネント配合錠LD | 1錠 |
| 院内 | プロウベス腔用剤10mg | 10mg/個 |
| 院内 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | 0.7mg/枚 |
| 院内 | プロジフ静注液200 | ホスフルコナゾール252.3mg（フルコナゾールとして200mg）2.5mL/V |
| 院内 | プロスタルモン・F注射液1000 | 1mg1mL/A |
| 院内 | プロスタンディン注射用20μg | 20μg/V |
| 院内 | プロスタンディン軟膏0.003% | 0.003%10g/本 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|---------------------------------|------------------------|
| 院内 | フロセミド錠20mg「NP」 | 20mg/T |
| 院内 | フロセミド注20mg「NIG」 | 20mg2mL/A |
| 院内 | プロタノールL注0.2mg | 0.2mg1mL/A |
| 院内 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 100mg10mL/V |
| 院内 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg/T |
| 院内 | プロテカジンOD錠10 | 10mg/T |
| 院内 | プロナーゼMS | 20000単位0.5g/包 |
| 院内 | プロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 4mg/T |
| 院内 | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 4mg2mL/A |
| 院内 | プロハンス静注シリンジ13mL | 3.63g13mL/筒 |
| 院内 | プロベト | 100g/本 |
| 院内 | プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg20mL/A |
| 院内 | プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 0.2%45mL/本 |
| 院内 | フロリードゲル経口用2% | 2%5g/本 |
| 院内 | ページニオ錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ページニオ錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ページニオ錠150mg | 150mg/T |
| 院内 | ペオーバ錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ペクティビックス点滴静注100mg | 100mg5mL/V |
| 院内 | ペクティビックス点滴静注400mg | 400mg20mL/V |
| 院内 | ペクルリー点滴静注用100mg | 100mg/瓶 |
| 院内 | ペサコリン散5% | 5% 50mg/g |
| 院内 | ペザトールSR錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | ベストロン耳鼻科用1% | 1%50mL/本（溶解後） |
| 院内 | ベタニス錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 6mg/T |
| 院内 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T |
| 院内 | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35mg1mL/A |
| 院内 | ベナンボックス注用300mg | 300mg/V |
| 院内 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4mg/T |
| 院内 | ベネット錠75mg | 75mg/T |
| 院内 | ベネトリン吸入液0.5% | 5mg/mL・30mL |
| 院内 | ベノキシル点眼液0.4% | 0.4%5mL/本 |
| 院内 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL | 1,000単位10mL/筒 |
| 院内 | ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」 | 5,000単位5mL/V |
| 院内 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 0.3%50g/本 |
| 院内 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 0.3%25g/本 |
| 院内 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 0.3%100g/本 |
| 院内 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5,000単位0.2mL/筒 |
| 院内 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 | 5,000単位10mL/筒 |
| 院内 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 | 10000単位20mL/筒 |
| 院内 | ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 0.5mL/本 |
| 院内 | ペプリコール錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ペボタシンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 10mg/T |
| 院内 | ペムリディ錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 100mg4mL/V |
| 院内 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 500mg20mL/V |
| 院内 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 800mg32mL/V |
| 院内 | ヘモポリゾン軟膏 | 2g/本 |
| 院内 | ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 40mg/T |
| 院内 | ペラプロストNa錠20 μ g「VTRS」 | 20 μ g/T |
| 院内 | ペリアクチン散1% | 10mg/g |
| 院内 | ペリキューガ錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院内 | ペリチーム配合顆粒 | 1.0g/包 |
| 院内 | ベルジピン注射液2mg | 2mg2mL/A |
| 院内 | ベルソムラ錠15mg | 15mg/T |
| 院内 | ベルソムラ錠20mg | 20mg/T |
| 院内 | ヘルベッサー注射用50 | 50mg/V |
| 院内 | ヘルベッサー-Rカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院内 | ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 4mg/T |
| 院内 | ベンザリン錠5 | 5mg/T |
| 院内 | ベンタサ坐剤1g | 1g/個 |
| 院内 | ベンタサ錠500mg | 500mg/T |
| 院内 | ベンタサ顆粒94% | 1000mg/包 |
| 院内 | ベントシリン注射用1g | 1g/V |
| 院内 | ベントシリン注射用2g | 2g/V |
| 院内 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg1mL/キット |
| 院内 | ベンレステープ18mg | (18mg) 30.5mm×50.0mm/枚 |
| 院内 | ボアラクリーム0.12% | 0.12%5g/本 |
| 院内 | ボアラ軟膏0.12% | 0.12%5g/本 |
| 院内 | ハウ酸「ケンエー」 | 3g/包 |
| 院内 | ボースデル内用液10 | マンガンとして10mg250mL/袋 |
| 院内 | ホーリンV腔用錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | ホクナリンテープ0.5mg | 0.5mg/枚 |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|--------------------------------|---------------------|
| 院内 | ホクナリンテープ1mg | 1mg/枚 |
| 院内 | ホクナリンテープ2mg | 2mg/枚 |
| 院内 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 0.3mg/T |
| 院内 | ホストイン静注750mg | 750mg10mL/V |
| 院内 | ホスミシンドライシロップ400 | 400mg/g |
| 院内 | ホスミン錠500 | 500mg/T |
| 院内 | ホスミンS静注用2g | 2g/V |
| 院内 | ボスミン外用液0.1% | 1mg/1mL |
| 院内 | ボスミン注1mg | 1mg1mL/A |
| 院内 | ホスリボン配合顆粒 | 100mg/包 |
| 院内 | ボトックス注用50単位 | 50単位/V |
| 院内 | ボナロン経口ゼリー35mg | 35mg2g/包 |
| 院内 | ボナロン点滴静注バック900μg | 900μg100mL/袋 |
| 院内 | ビビドン液10% | 10%250mL/本（有効ヨウ素1%） |
| 院内 | ビビドンスクラブ7.5% | 7.5%500mL/本 |
| 院内 | ボラザG軟膏 | 2.4g/個 |
| 院内 | ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 75mg/T |
| 院内 | ボララミン錠2mg | 2mg/T |
| 院内 | ボララミン注5mg | 5mg1mL/A |
| 院内 | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 50mg/T |
| 院内 | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 200mg/T |
| 院内 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 20%25g/個 |
| 院内 | ホリゾン注射液10mg | 10mg2mL/A |
| 院内 | ポリフル細粒83.3% | 83.3%0.6g/包 |
| 院内 | ポリフル錠500mg | 500mg/T |
| 院内 | ポルタレン錠25mg | 25mg/T |
| 院内 | ポルトラック原末 | 6g/包 |
| 院内 | ポルヒール組織接着用 | 1mL製剤1組 |
| 院内 | ポルヒール組織接着用 | 3mL製剤1組 |
| 院内 | ポルベン輸液6% | 30g500mL/袋 |
| 院内 | ボンビバ静注1mgシリンジ | 1mg1mL/筒 |
| 院内 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 20mg4mL/A |
| 院内 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 20mg4mL/A |
| 院内 | マヴィレット配合錠 | 1錠 |
| 院内 | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」 | 2.5μg1mL/筒 |
| 院内 | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」 | 5μg1mL/筒 |
| 院内 | マキユエイド眼注用40mg | 40mg/瓶 |
| 院内 | マグコロール散68%分包50g | 34g/50g/包 |
| 院内 | マグコロール散68%分包100g | 68g/100g/パウチ |
| 院内 | マグセント注100mL | 100mL/瓶 |
| 院内 | マグミット錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | マグミット錠330mg | 330mg/T |
| 院内 | マスキンR・エタノール液（0.5W/V%） | 0.5%500mL/本 |
| 院内 | マスキンスクラブ4% | 4%500mL/本 |
| 院内 | マドバー配合錠L100 | 1錠 |
| 院内 | マンニトールS注射液 | 300mL/袋 |
| 院内 | ミオコールスプレー0.3mg | 0.65%7.2g/缶 |
| 院内 | ミオナール錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | 50mg/V |
| 院内 | ミグシス錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | ミコンビ配合錠BP | 1錠 |
| 院内 | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | 10mg2mL/A |
| 院内 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 5mg/T |
| 院内 | ミティキュアダニ舌下錠3,300IAU | 3300IAU/T |
| 院内 | ミティキュアダニ舌下錠10,000IAU | 10000IAU/T |
| 院内 | ミドリンM点眼液0.4% | 0.4%5mL/本 |
| 院内 | ミドリンP点眼液 | 5mL/本 |
| 院内 | ミネプロOD錠2.5mg | 2.5mg/T |
| 院内 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | 100mg/V |
| 院内 | ミノマイシンカプセル100mg | 100mg/cap |
| 院内 | ミノマイシン錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ミヤBM細粒 | 40mg1g/包 |
| 院内 | ミヤBM錠 | 20mg/T |
| 院内 | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位1mL/A |
| 院内 | ミラベックスLA錠1.5mg | 1.5mg/T |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ25μg | 25μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ50μg | 50μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ100μg | 100μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ150μg | 150μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ200μg | 200μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルセラ注シリンジ250μg | 250μg0.3mL/筒 |
| 院内 | ミルリーラ注射液10mg | 10mg10mL/A |
| 院内 | ミレーナ52mg | 52mg/個 |
| 院内 | ミンクリア内用散布液0.8% | 0.8%20mL/筒 |
| 院内 | 無水エタノール注「フソー」 | 5mL/A |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|-----------------------------|---|
| 院内 | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | 7.5mg0.15mL/キット |
| 院内 | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | 10mg0.2mL/キット |
| 院内 | メイラックス錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | メイロン静注8.4% | 1.68g20mL/A |
| 院内 | メイロン静注8.4% | 21g250mL/袋 |
| 院内 | メキシチールカプセル50mg | 50mg/cap |
| 院内 | メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | 100mg/T |
| 院内 | メサベイン錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | メサベイン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | メスチノン錠60mg | 60mg/T |
| 院内 | メチコパール錠500 μ g | 500 μ g/T |
| 院内 | メチコパール注射液500 μ g | 500 μ g1mL/A |
| 院内 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 0.125mg/T |
| 院内 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 0.2mg1mL/A |
| 院内 | 滅菌精製水 | 500mL/本 |
| 院内 | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 5mg/T |
| 院内 | メトクロプラミド注10mg「NIG」 | 10mg2mL/A |
| 院内 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 2mg/T |
| 院内 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 250mg/T |
| 院内 | メドレニック注 | 2mL/A |
| 院内 | メドロール錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | メブチンシロップ5 μ g/mL | 5 μ g/mL |
| 院内 | メブチンドライシロップ0.005% | 50 μ g/g |
| 院内 | メブチン吸入液ユニット0.3mL | 100 μ g/mL (0.3mL/個) |
| 院内 | メブチン吸入液ユニット0.5mL | 100 μ g/mL (0.5mL/個) |
| 院内 | メブチンエア-10 μ g吸入100回 | 143 μ g/g 5mL/キット (1回噴霧中10 μ g) |
| 院内 | メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 5mg/T |
| 院内 | メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 10mg/T |
| 院内 | メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 20mg/T |
| 院内 | メルカゾール錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | メロベネム点滴静注用1g「明治」 | 1g/V |
| 院内 | モービック錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | 0.5%5mL/本 |
| 院内 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 10mg/g |
| 院内 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | 5mg/T |
| 院内 | モビコール配合内用剤LD | 6.08523g/包 |
| 院内 | モビブレップ配合内用剤 | 244.212g/袋 |
| 院内 | モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用 | 50 μ g56噴霧10g/本 |
| 院内 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 | 10mg1mL/A |
| 院内 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | 50mg5mL/A |
| 院内 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 10mg/T |
| 院内 | 薬用炭「日医工」 | 末 50g/本 |
| 院内 | ユーロジン2mg錠 | 2mg/T |
| 院内 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g/V |
| 院内 | ユリノーム錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 300単位/キット |
| 院内 | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 | 60%500mL/瓶 |
| 院内 | ラクティオンバップ70mg | 70mg14.0g/枚 |
| 院内 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 12g/包 |
| 院内 | ラゲブリオ錠400mg | 400mg/T |
| 院内 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | 0.005%2.5mL/本 |
| 院内 | ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg/袋 |
| 院内 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 10mg/T |
| 院内 | ラミクタール錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | ラミシールクリーム1% | 1%10g/本 |
| 院内 | ラミシール錠125mg | 125mg/T |
| 院内 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg/T |
| 院内 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 15mg/T |
| 院内 | ランタスXR注ノロスター | 450単位1.5mL/キット |
| 院内 | ランドセン錠0.5mg | 0.5mg/T |
| 院内 | ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | 120mg1mL/筒 |
| 院内 | リアルダ錠1200mg | 1200mg/T |
| 院内 | リーゼ錠5mg | 5mg/T |
| 院内 | リーバクト配合顆粒 | 4.15g/包 |
| 院内 | リーマス錠200 | 200mg/T |
| 院内 | リオナ錠250mg | 250mg/T |
| 院内 | リカルボン錠50mg | 50mg/T |
| 院内 | リクシアナOD錠15mg | 15mg/T |
| 院内 | リクシアナOD錠30mg | 30mg/T |
| 院内 | リクシアナOD錠60mg | 60mg/T |
| 院内 | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100mL/袋 |
| 院内 | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12800U/V |
| 院内 | リスバダール内用液1mg/mL | 0.5mg0.5mL/包 |
| 院内 | リスバダール内用液1mg/mL | 1mg1mL/包 |
| 院内 | リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 0.5mg/T |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 院内 | リスベリドンOD錠1mg「トーワ」 | 1mg/T |
| 院内 | リスミール錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | リズミック錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | リツキサン点滴静注100mg | 100mg10mL/V |
| 院内 | リツキサン点滴静注500mg | 500mg50mL/V |
| 院内 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg10mL/V |
| 院内 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg50mL/V |
| 院内 | リドカインテープ18mg「YP」 | 18mg/枚 |
| 院内 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 | 50mg5mL/A |
| 院内 | リドメックスコーワローション0.3% | 0.3%10g/本 |
| 院内 | リネイルゲル10% | 0.5g/袋 |
| 院内 | リバクレオン顆粒300mg分包 | 顆粒300mg/包 |
| 院内 | リビオドール480注10mL | 10mL/A (I : 480mg/mL) |
| 院内 | リビディル錠80mg | 80mg/T |
| 院内 | リファンピシンプセル150mg「サンド」 | 150mg/cap |
| 院内 | リフキシマ錠200mg | 200mg/T |
| 院内 | リフレックス錠15mg | 15mg/T |
| 院内 | リベルサス錠3mg | 3mg/T |
| 院内 | リベルサス錠7mg | 7mg/T |
| 院内 | リベルサス錠14mg | 14mg/T |
| 院内 | リマチル錠100mg | 100mg/T |
| 院内 | リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」 | 5 μ g/T |
| 院内 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 20mL/A (0.5mol/L) |
| 院内 | リユープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg/筒 |
| 院内 | リユープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg/筒 |
| 院内 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 3.75mg/筒 |
| 院内 | リレンザ | 5mg/プリスター |
| 院内 | リンゴック錠7.5mg | 7.5mg/T |
| 院内 | リンゴック錠15mg | 15mg/T |
| 院内 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL/A |
| 院内 | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg/T |
| 院内 | リンデロン注4mg (0.4%) | 4mg1mL/A |
| 院内 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院内 | リンデロン-Vローション | 0.12%10mL/本 |
| 院内 | リンデロン-VGローション | 10mL/本 |
| 院内 | リンデロン-VG軟膏0.12% | 0.12%5g/本 |
| 院内 | ルバフィン錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | ルミガン点眼液0.03% | 0.03%2.5mL/本 |
| 院内 | ルミセフ皮下注210mgペン | 210mg1.5mL/キット |
| 院内 | ルリコンクリーム1% | 1%10g/本 |
| 院内 | ルリコン液1% | 1%10mL/本 |
| 院内 | レキップ錠0.25mg | 0.25mg/T |
| 院内 | レキップ錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 1.5L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3515) |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 1.5L/袋 (排液用バッグ付) (ATB3415) |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 2L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3516) |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3416) |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 2.5L/袋 (シングルバッグ) (ATB3617) |
| 院内 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液 | 5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3619) |
| 院内 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液 | 1.5L/袋 (ツインバッグ) (ATB3425) |
| 院内 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液 | 1.5L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3525) |
| 院内 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液 | 2L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3526) |
| 院内 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液 | 2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3426) |
| 院内 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液 | 5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3629) |
| 院内 | レクサプロ錠10mg | 10mg/T |
| 院内 | レケンピ点滴静注200mg | 200mg2mL/V |
| 院内 | レケンピ点滴静注500mg | 500mg5mL/V |
| 院内 | レスタミンコーワクリーム1% | 1%500g/本 |
| 院内 | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 2.5mg/T |
| 院内 | レナデックス錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | リパーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 10mg/T |
| 院内 | リパーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 15mg/T |
| 院内 | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T |
| 院内 | レバミビド錠100mg「NPJ」 | 100mg/T |
| 院内 | レブラミドカプセル5mg | 5mg/cap |
| 院内 | レバタン坐剤0.2mg | 0.2mg/個 |
| 院内 | レバタン注0.2mg | 0.2mg1mL/A |
| 院内 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 500mg/T |
| 院内 | レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 500mg/g |
| 院内 | レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | 500mg5mL/A |
| 院内 | レベトールカプセル200mg | 200mg/cap |
| 院内 | レベミル注フレックスベン | 300単位3mL/筒 |
| 院内 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 5mg/T |
| 院内 | レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | 5mg/g |
| 院内 | リボトリール細粒0.1% | 1mg/g |

| 病院区分 | 商品名 | 規格 |
|------|----------------------------------|---------------------------------|
| 院内 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 500mg/T |
| 院内 | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 1.5%5mL/本 |
| 院内 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL/袋 |
| 院内 | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | 25mg/V（レボホリナートとして） |
| 院内 | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | 100mg/V（レボホリナートとして） |
| 院内 | レボメフロマジン錠25mg「ツルハラ」 | 25mg/T |
| 院内 | レミケード点滴静注用100 | 100mg/V |
| 院内 | レミニールOD錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | レミニールOD錠8mg | 8mg/T |
| 院内 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg/V |
| 院内 | レルベア100エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院内 | レルベア200エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院内 | レルミナ錠40mg | 40mg/T |
| 院内 | レンビマカプセル4mg | 4mg/cap |
| 院内 | ロイケリン散10% | 100mg/g |
| 院内 | ロキソニンゲル1% | 1%25g/本 |
| 院内 | ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 | 60mg/T |
| 院内 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | 100mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚入り） |
| 院内 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 | 50mg5mL/V |
| 院内 | ロケルマ懸濁用散分包5g | 5g/包 |
| 院内 | ロコイドクリーム0.1% | 0.1%5g/本 |
| 院内 | ロコイド軟膏0.1% | 0.1%5g/本 |
| 院内 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg/T |
| 院内 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 5mg/T |
| 院内 | ロゼウス静注液10mg | 10mg/瓶 |
| 院内 | ロゼウス静注液40mg | 40mg/瓶 |
| 院内 | ロタテック内用液 | 2mL/チューブ |
| 院内 | ロナセンテープ40mg | 40mg/枚 |
| 院内 | ロナプリーブ注射液セット1332 | 11.1mL/V |
| 院内 | ロピオン静注50mg | 50mg5mL/A |
| 院内 | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 1mg/cap |
| 院内 | ロルカム錠4mg | 4mg/T |
| 院内 | ロンサーフ配合錠T15 | 1錠 |
| 院内 | ロンサーフ配合錠T20 | 1錠 |
| 院内 | ワーファリン顆粒0.2% | 2mg/g |
| 院内 | ワーファリン錠1mg | 1mg/T |
| 院内 | ワイバックス錠0.5 | 0.5mg/T |
| 院内 | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.5mg1mL/A |
| 院内 | ワソラン静注5mg | 5mg2mL/A |
| 院内 | ワントラム錠100mg | 100mg/T |