

糖尿病新聞

糖尿病チーム 発行
2010年12月17日 第2号

低血糖について ~Part. 1~



低血糖を起こす可能性のある薬

スルフォニル尿素系製剤

アマリール パミルコン グリミクロン



経口糖尿病剤(血糖降下剤)や、インスリン注射を使っていると、低血糖を起こすことがあります。低血糖の対処法はブドウ糖や砂糖をすぐ摂ることで。

速効型食後血糖降下薬

スターシス グルファスト



インスリン製剤



★ α -グルコシダーゼ阻害剤である、ベイスンOD錠、セイブル錠は単独で低血糖を起こすことはありませんが、他の血糖降下剤と一緒に服用して低血糖を起こした場合は、砂糖ではなく必ず**ブドウ糖**をとって下さい(これらの薬剤は砂糖の消化や吸収を遅らせます)。

α -グルコシターゼ阻害剤

ベイスンOD

セイブル



低血糖の症状

血糖値(mg/dL)

70 空腹感、あくび、悪心

50 無気力、倦怠感
計算力減退

40 発汗(冷汗)、動悸(頻脈)
ふるえ、顔面蒼白、紅潮

30 意識消失、異常行動

20 けいれん、昏睡

10



低血糖にはいろいろな症状があります。人によって症状の出方が違います。

当院にしているブドウ糖



薬剤部で
もらえます

